

EK-1
İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN VE TÜRKİYE'DE VARLIĞI BİLİNMEYEN
KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

1) Böcekler

<i>Acalymma trivittatum</i> (Mannerheim) [ACAYTR]
<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL]
<i>Acleris issikii</i> (Oku) [ACLRIS]
<i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI]
<i>Acleris nishidai</i> (Brown) [ACLRNI]
<i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV]
<i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO]
<i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE]
<i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE]
<i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
<i>Acrobasis pirivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
<i>Agrilus anxius</i> (Gory) [AGRLAX]
<i>Agrilus auroguttatus</i> (Schäffer) [AGRLGT]
<i>Agrilus fleischeri</i> (Obenberger) [AGRLFL]
<i>Agrilus mali</i> (Matsumura) [AGRLMA]
<i>Agrilus planipennis</i> (Fairmaire) [AGRLPL]
<i>Aleurocanthus citriperdus</i> (Quaintance & Baker) [ALECCT]
<i>Aleurocanthus woglumi</i> (Ashby) [ALECWO]
<i>Aleurolobus marlatti</i> (Quaintance) [ALERMA]
<i>Aleurothrix trachoides</i> (Back) [ALTRTR]
<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling) [ANTHBI]
<i>Anthonomus eugenii</i> (Cano) [ANTHEU]
<i>Anthonomus grandis</i> (Boheman) [ANTHGR]
<i>Anthonomus quadrigibbus</i> (Say) [TACYQU]
<i>Anthonomus signatus</i> (Say) [ANTHSI]
<i>Aphis citricidus</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
<i>Apriona cinerea</i> (Chevrolat) [APRICI]
<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
<i>Apriona rugicollis</i> (Chevrolat) [APRIJA]
<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura) [ARBOKA]
<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
<i>Arrhenodes minutus</i> (Drury) [ARRHMI]
<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc) [PARZCO]
<i>Byakushincecis eppoi</i> (Inouye) [ASCXEP]
<i>Callidium</i> spp. (Fabricius)
<i>Carposina niponensis</i> (Walsingham) [CARSNI]
<i>Carposina sasakii</i> (Matsumura) [CARSSA]
<i>Ceratotheripoides brunneus</i> (Bagnall) [CRTZBR]
<i>Ceratotheripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
<i>Ceropalesis</i> spp. (Audinet-serville)
<i>Chionaspis pinifoliae</i> (Fitch) [PHECPI]

	<i>Chloridea virescens</i> (Fabricius) [HELIVI]
	<i>Choristoneura</i> spp. (Lederer) [1CHONG]
	<i>Chrysobothris femorata</i> (Olivier) [CHRBFE]
	<i>Chrysobothris mali</i> (Horn) [CHRBMA]
	<i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) [CHRXER]
<i>Cicadomorpha</i>, <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörleri olarak bilinen (Wells et al.)	
[XYLEFA]:	
1.	<i>Acrogonia citrina</i> (Marucci & Cavichioli) [ACRGCI]
2.	<i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI]
3.	<i>Aphrophora angulata</i> (Ball) [APHRAN]
4.	<i>Aphrophora permutata</i> (Uhler) [APHRPE]
5.	<i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE]
6.	<i>Bucephalagonia xanthophis</i> (Berg) [BUCLXA]
7.	<i>Clastoptera achatina</i> (Germar) [CLASAC]
8.	<i>Clastoptera brunnea</i> (Ball) [CLASBR]
9.	<i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO]
10.	<i>Cuerna occidentalis</i> (Oman ve Beamer) [CUEROC]
11.	<i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) [CYPACG]
12.	<i>Dechacona missionum</i> (Berg) [ONCMMI]
13.	<i>Dilobopterus costalimai</i> (Young) [DLBPCO]
14.	<i>Draeculacephala minerva</i> (Ball) [DRAEMI]
15.	<i>Ferrariana trivittata</i> (Signoret) [FRRATR]
16.	<i>Fingeriana dubia</i> (Cavichioli) [FINGDU]
17.	<i>Friscanus friscanus</i> (Ball) [FRISFR]
18.	<i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]
19.	<i>Graphocephala confluens</i> (Uhler) [GRCPCF]
20.	<i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE]
21.	<i>Helochara delta</i> (Oman) [HELHDE]
22.	<i>Homalodisca ignorata</i> (Melichar) [HOMLIG]
23.	<i>Homalodisca insolita</i> (Walker) [HOMLIN]
24.	<i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
25.	<i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU]
26.	<i>Macugonalia cavifrons</i> (Stål) [MAGOCA]
27.	<i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) [MAGOLE]
28.	<i>Molomea consolidata</i> (Schröder) [MOLMCO]
29.	<i>Neokolla hieroglyphica</i> (Say) [GRCPHI]
30.	<i>Neokolla severini</i> (DeLong) [NKOLSE]
31.	<i>Oncometopia facialis</i> (Signoret) [ONCMFA]
32.	<i>Oncometopia nigricans</i> (Walker) [ONCMNI]
33.	<i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN]
34.	<i>Oragua discoidula</i> (Osborn) [ORAGDI]
35.	<i>Pagaronia confusa</i> (Oman) [PGARCO]
36.	<i>Pagaronia furcata</i> (Oman) [PGARFU]
37.	<i>Pagaronia tredecimpunctata</i> (Ball) [PGARTR]
38.	<i>Pagaronia triunata</i> (Ball) [PGARTN]

39.	<i>Parathona gratioza</i> (Blanchard) [PTHOGR]
40.	<i>Plesiommata corniculata</i> (Young) [PLSOCO]
41.	<i>Plesiommata mollicella</i> (Fowler) [PLSOMO]
42.	<i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO]
43.	<i>Sibovia sagata</i> (Signoret) [SIBOSA]
44.	<i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) [SONEGR]
45.	<i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) [TAPARU]
46.	<i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL]
47.	<i>Xyphon fulgidum</i> (Nottingham) [CARNFU]
48.	<i>Xyphon triguttatum</i> (Nottingham) [CARNTR]
	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
	<i>Contarinia pseudotsugae</i> (Condrashoff) [CONTPS]
	<i>Cordylomera spinicornis</i> (Fabricius) [CRDMSN]
	<i>Crisicoccus pini</i> (Kuwana) [DACLPI]
	<i>Dendroctonus adjunctus</i> (Blandford) [DENCAD]
	<i>Dendroctonus brevicomis</i> (LeConte) [DENCBR]
	<i>Dendroctonus frontalis</i> (Zimmermann) [DENCFR]
	<i>Dendroctonus ponderosae</i> (Hopkins) [DENCPO]
	<i>Dendroctonus pseudotsugae</i> (Hopkins) [DENCPS]
	<i>Dendroctonus rufipennis</i> (Kirby) [DENCRO]
	<i>Dendroctonus valens</i> (LeConte) [DENCVA]
	<i>Dendrolimus sibiricus</i> (Chetverikov) [DENDSI]
	<i>Dendrolimus superans</i> (Butler) [DENDSU]
	<i>Diabrotica balteata</i> (LeConte) [DIABBA]
	<i>Diabrotica barberi</i> (Smith & Lawrence) [DIABLO]
	<i>Diabrotica speciosa</i> (Germar) [DIABSC]
	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> (Barber) [DIABUH]
	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> (Mannerheim) [DIABUN]
	<i>Diabrotica virgifera zea</i> (Krysan ve Smith) [DIABVZ]
	<i>Diaphorina citri</i> (Kuwayama) [DIAACI]
	<i>Diaprepes abbreviatus</i> (Linnaeus) [DPREAB]
	<i>Dimargarodes meridionalis</i> (Morrison) [MARGME]
	<i>Dryocoetes confusus</i> (Swaine) [DRYOCN]
	<i>Dysmicoccus brevipes</i> (Cockerell) [DYSMBR]
	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> (Beardsley) [DYSMNE]
	<i>Elasmopalpus lignosellus</i> (Zeller) [ELASLI]
	<i>Epichoristodes acerbella</i> (Walker) [EPIOIO]
	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris) [EPIXCU]
	<i>Epitrix papa</i> (Orlova-Bienkowskaja) [EPIXPP]
	<i>Epitrix similis</i> (Gentner) [EPIXSI]
	<i>Epitrix subcrinita</i> (LeConte) [EPIXSU]
	<i>Epitrix tuberosa</i> (Gentner) [EPIXTU]
	<i>Erythroneura comes</i> (Say) [ERYTCO]
	<i>Eumargarodes laingi</i> (Jakubski) [EUMGLA]
	<i>Euplatypus parallelus</i> (Fabricius) [PLTPPA]
	<i>Eurhizococcus brasiliensis</i> (Wille) [EURHBR]

<i>Eurhizococcus colombianus</i> (Jakubski) [EURHCO]
<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
<i>Euzophera osseatella</i> (Treitschke) [EUZOOS]
<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
<i>Ferrisia virgata</i> (Cockerell) [PSECVI]
<i>Fiorinia phantasma</i> (Cockerell & Robinson) [FIORCO]
<i>Gnathotrichus sulcatus</i> (LeConte) [GNAHSU]
<i>Gonipterus gibberus</i> (Boisduval) [GONPGI]
<i>Gonipterus scutellatus</i> (Gyllenhal) [GONPST]
<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
<i>Grapholita packardi</i> (Zeller) [LASPPA]
<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
<i>Gymnandrosoma aurantianum</i> (Lima) [ECDYAU]
<i>Haplaxius crudus</i> (Van Duzee) [MYNDCR]
<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
<i>Heteronychus arator</i> (Fabricius) [HETRAR]
<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eichhoff) [HYLRRU]
<i>Ips calligraphus</i> (Germar) [IPXCA]
<i>Ips confusus</i> (LeConte) [IPXCO]
<i>Ips grandicollis</i> (Eichhoff) [IPXGR]
<i>Ips hauseri</i> (Reitter) [IPXHA]
<i>Ips lecontei</i> (Swaine) [IPXLE]
<i>Ips paraconfusus</i> (Lanier) [IPXPA]
<i>Ips pini</i> (Say) [IPXPI]
<i>Ips plastographus</i> (LeConte) [IPXPL]
<i>Ips subelongatus</i> (Motschulsky) [IPXFA]
<i>Jacobiasca lybica</i> (de Bergevin) [EMPOLY]
<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
<i>Lambdina fiscellaria</i> (Guenée) [LAMBFI]
<i>Lepidosaphes ussuriensis</i> (Borkhsenius) [LEPSUS]
<i>Leucinodes africensis</i> (Mally, Korycinska, Agassiz, Hall, Hodgetts & Nuss) [LEUIAF]
<i>Leucinodes orbonalis</i> (Guenée) [LEUIOR]
<i>Leucinodes pseudorbonalis</i> (Mally, Korycinska, Agassiz, Hall, Hodgetts & Nuss) [LEUIPS]
<i>Leucinodes rimavallis</i> (Mally, Korycinska, Agassiz, Hall, Hodgetts & Nuss) [LEUIRI]
<i>Limonius californicus</i> (Mannerheim) [LIMOCF]
<i>Linepithema humile</i> (Mayr) [IRIDHU]
<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
<i>Lymantria mathura</i> (Fabricius) [LYMAMA]
<i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green) [PHENHI]
<i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius) [MALAAM]
<i>Malacosoma disstria</i> (Hübner) [MALADI]
<i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger) [MALAPA]
<i>Margarodes capensis</i> (Giard) [MARGCA]

<i>Margarodes greeni</i> (Brain) [MARGGR]
<i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR]
<i>Margarodes trimeni</i> (Giard) [MARGTR]
<i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI]
<i>Margarodes vredendalensis</i> (de Klerk) [MARGVR]
<i>Matsucoccus feytaudi</i> (Ducasse) [MATSE]
<i>Megaplatypus mutatus</i> (Chapuis) [PLTPMU]
<i>Melanaspis bromiliae</i> (Leonardi) [MELABR]
<i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal) [MELNCO]
<i>Metamasius hemipterus</i> (Linnaeus) [METAHE]
<i>Milviscutulus mangiferae</i> (Green) [MILVMA]
<i>Monochamus</i> spp. (Dejean) [1MONCG]
<i>Naupactus leucoloma</i> (Boheman) [GRAGLE]
<i>Naupactus xanthographus</i> (Germar) [NAUPXA]
<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
<i>Neocerambyx raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
<i>Neoceratitis cyanescens</i> (Bezzi) [CERTCY]
<i>Neoclytus</i> spp. (Thomson) [1NEOYG]
<i>Neodiprion abietis</i> (Harris) [NEODAB]
<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
<i>Nipaecoccus viridis</i> (Newstead) [NIPAVI]
<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
<i>Opogona sacchari</i> (Bojer) [OPOGSC]
<i>Orgyia leucostigma</i> (Smith) [HEMELE]
<i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough) [ORGYPS]
<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) [PAYSAR]
<i>Philematium</i> spp. (Thomson)
<i>Phlyctinus callosus</i> (Schönherr) [PHLYCA]
<i>Phrynetta leprosa</i> (Fabricius) [INESLE]
<i>Phyrdenus muriceus</i> (Germar) [PHRDMU]
<i>Pissodes cibriani</i> (O'Brien) [PISOCI]
<i>Pissodes fasciatus</i> (LeConte) [PISOFA]
<i>Pissodes nemorensis</i> (Germar) [PISONE]
<i>Pissodes nitidus</i> (Roelofs) [PISONI]
<i>Pissodes punctatus</i> (Langor & Zhang) [PISOPU]
<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
<i>Pissodes terminalis</i> (Hopping) [PISOTE]
<i>Pissodes yunnanensis</i> (Langor & Zhang) [PISOYU]
<i>Pissodes zitacuarensis</i> (Sleeper) [PISOZI]
<i>Pityophthorus juglandis</i> (Blackman) [PITOJU]
<i>Platynota stultana</i> (Walsingham) [PLAAST]
<i>Polygraphus proximus</i> (Blandford) [POLGPR]
<i>Popillia japonica</i> (Newman) [POPIJA]
<i>Porphyrophora tritici</i> (Bodenheimer) [PORPTR]
<i>Premnotypes</i> spp. (Pierce) [1PREMG]
<i>Pristiphora abietina</i> (Christ) [PRISAB]

<i>Prodiplosis longifila</i> (Gagné) [PRDILO]
<i>Pseudacysta perseae</i> (Heidemann) [PSEYPE]
<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i> (Cooley) [PSEACO]
<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
<i>Pseudopityophthorus pruinosus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
<i>Resseliella theobaldi</i> (Barnes) [THOMTE]
<i>Rhigopsidius tucumanus</i> (Heller) [RHGPTU]
<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i> (Ahlberg) [DIARCH]
<i>Rhynchophorus palmarum</i> (Linnaeus) [RHYCPA]
<i>Ripersiella hibisci</i> (Kawai & Takagi) [RHIOHI]
<i>Saperda candida</i> (Fabricius) [SAPECN]
<i>Saperda tridentata</i> (Olivier) [SAPETR]
<i>Scaphoideus luteolus</i> (Van Duzee) [SCAPLU]
<i>Scaphoideus titanus</i> (Ball) [SCAPLI]
<i>Scaphytopius acutus</i> (Say) [SCAHAC]
<i>Scirtothrips aurantii</i> (Faure) [SCITAU]
<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
<i>Scolytus morawitzi</i> (Semenov) [SCOLMO]
<i>Selenothrips rubrocinctus</i> (Giard) [SLENRU]
<i>Sirex ermak</i> (Semenov-Tian-Shanskij) [SIRXER]
<i>Sirex noctilio</i> (Fabricius) [SIRXNO]
<i>Spodoptera eridania</i> (Stoll) [PRODER]
<i>Spodoptera exempta</i> (Walker) [LAPHEX]
<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
<i>Spodoptera ornithogalli</i> (Guenée) [PRODOR]
<i>Spodoptera praefica</i> (Grote) [PRODPR]
<i>Sternochetus mangiferae</i> (Fabricius) [CRYPMA]
<i>Strobilomyia viaria</i> (Huckett) [STRMVI]
<i>Tecia solanivora</i> (Povolny) [TECASO]

Tephritidae:

1.	<i>Acanthonevra dunlopi</i> (Wulp) [ACNVDU]
2.	<i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) [ACIEKA]
3.	<i>Acidoxantha bombacis</i> (de Meijere) [ACIXBO]
4.	<i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) [ACRSDI]
5.	<i>Adrama</i> spp. (Walker) [1ADRAG]
6.	<i>Anastrepha curvicauda</i> (Gerstaecker) [TOXTCU]
7.	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR]
8.	<i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU]
9.	<i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB]
10.	<i>Anastrepha recurcauda</i> (Tigrero) [ANSTRE]
11.	<i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU]
12.	<i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) [ASIMPA]
13.	<i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) [AUSHPR]
14.	<i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]
15.	<i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA]
16.	<i>Bactrocera minax</i> (Enderlein) [DACUCT]

17.	<i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR]
18.	<i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS]
19.	<i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO]
20.	<i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) [BISRFO]
21.	<i>Bistrispinaria magniceps</i> (Bezzi) [BISRMA]
22.	<i>Callistomyia flavilabris</i> (Hering) [CLMYFL]
23.	<i>Campiglossa albiceps</i> (Loew) [CAMGAL]
24.	<i>Campiglossa californica</i> (Novak) [CAMGCA]
25.	<i>Campiglossa duplex</i> (Becker) [CAMGDU]
26.	<i>Campiglossa reticulata</i> (Becker) [CAMGRE]
27.	<i>Campiglossa snowi</i> (Hering) [CAMGSN]
28.	<i>Carpomya incompleta</i> (Becker) [CARYIN]
29.	<i>Ceratitidis quinaria</i> (Bezzi) [CERTQU]
30.	<i>Ceratitidis rosa</i> (Karsch) [CERTRO]
31.	<i>Craspedoxantha marginalis</i> (Wiedemann) [CRSXMA]
32.	<i>Dioxya chilensis</i> (Macquart) [DIOXCH]
33.	<i>Dirioxa pornia</i> (Walker) [TRYEMU]
34.	<i>Euleia separata</i> (Becker) [EULISE]
35.	<i>Euphranta camelliae</i> (Ito) [EPHNCA]
36.	<i>Euphranta canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]
37.	<i>Euphranta cassiae</i> (Munro) [RHACCA]
38.	<i>Euphranta japonica</i> (Ito) [RHACJA]
39.	<i>Euphranta oshimensis</i> (Shiraki) [EPHNOS]
40.	<i>Eurosta solidaginis</i> (Fitch) [EUOSSO]
41.	<i>Eutreta</i> spp. (Loew) [1EUTTG]
42.	<i>Gastrozona nigrifemur</i> (David & Hancock) [GASZNI]
43.	<i>Goedenia stenoparia</i> (Steyskal) [GOEDST]
44.	<i>Gymnocarena</i> spp. (Hering) [1GYMRG]
45.	<i>Insizwa oblita</i> (Munro) [INZWOB]
46.	<i>Marriottella exquisita</i> (Munro) [MARREX]
47.	<i>Monacrostichus citricola</i> (Bezzi) [MNAHCI]
48.	<i>Neaspilota alba</i> (Löw) [NEAIAL]
49.	<i>Neaspilota reticulata</i> (Norrbon & Foote) [NEAIRE]
50.	<i>Paracantha trinotata</i> (Foote) [PCANTR]
51.	<i>Parastenopa limata</i> (Coquillett) [PSTELI]
52.	<i>Paratephritis fukaii</i> (Shiraki) [PTEPFU]
53.	<i>Paratephritis takeuchii</i> (Ito) [PTEPTA]
54.	<i>Paraterellia varipennis</i> (Coquillett) [PTLLVA]
55.	<i>Philophylla fossata</i> (Fabricius) [PHIPFO]
56.	<i>Procecidochares</i> spp. (Hendel) [1PROIG]
57.	<i>Ptilona confinis</i> (Walker) [PTIOCO]
58.	<i>Ptilona persimilis</i> (Hendel) [PTIOPE]
59.	<i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew) [RHAGCI]
60.	<i>Rhagoletis completa</i> (Cresson) [RHAGCO]
61.	<i>Rhagoletis fausta</i> (Osten Sacken) [RHAGFA]
62.	<i>Rhagoletis indifferens</i> (Curran) [RHAGIN]

63.	<i>Rhagoletis mendax</i> (Curran) [RHAGME]
64.	<i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]
65.	<i>Rhagoletis ribicola</i> (Doane) [RHAGRI]
66.	<i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU]
67.	<i>Sphaeniscus binoculatus</i> (Bezzi) [SFANBI]
68.	<i>Sphenella nigricornis</i> (Bezzi) [SFENNI]
69.	<i>Strauzia</i> spp. (Robineau-Desvoidy) [ISTRAG]
70.	<i>Taomyia marshalli</i> (Bezzi) [TAOMMA]
71.	<i>Tephritis leavittensis</i> (Blanc) [TEPRLE]
72.	<i>Tephritis luteipes</i> (Merz) [TEPRLU]
73.	<i>Tephritis ovatipennis</i> (Foote) [TEPROV]
74.	<i>Tephritis pura</i> (Löw) [TEPRPU]
75.	<i>Trupanea bisetosa</i> (Coquillett) [TRUPBI]
76.	<i>Trupanea femoralis</i> (Thomson) [TRUPFE]
77.	<i>Trupanea wheeleri</i> (Curran) [TRUPWH]
78.	<i>Trypanocentra nigrithorax</i> (Malloch) [TRYNNI]
79.	<i>Trypeta flaveola</i> (Coquillett) [TRYEFL]
80.	<i>Urophora christophi</i> (Loew) [URORCH]
81.	<i>Zacerata asparagi</i> (Coquillett) [ZACEAS]
82.	<i>Zeugodacus cucumis</i> (French) [DACUCM]
83.	<i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU]
84.	<i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
	<i>Tetraleurodes perseae</i> (Nakahara) [TETLPE]
	<i>Tetropium gracilicorne</i> (Reitter) [TETOGR]
	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
	<i>Thrips palmi</i> (Karny) [THRIPL]
	<i>Thrips setosus</i> (Moulton) [THRISE]
	<i>Toumeyella parvicornis</i> (Cockerell) [TOUMPA]
	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) [HESOCA]
	<i>Trioza erytrae</i> (Del Guercio) [TRIZER]
	<i>Trirachys sartus</i> (Solsky) [AELSSA]
	<i>Trochoideus desjardinsi</i> (Guérin-Méneville)
	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
	<i>Unaspis yanonensis</i> (Kuwana) [UNASYA]
	<i>Xylosandrus compactus</i> (Eichhoff) [XYLSCO]
	<i>Xylotrechus altaicus</i> (Gebler) [XYLOAL]
	<i>Xylotrechus chinensis</i> (Chevrolat) [XYLOCH]
	<i>Xylotrechus namanganensis</i> (Heyden) [XYLONM]

2) Akarlar

<i>Aculops fuchsiae</i> (Keifer) [ACUPFU]
<i>Brevipalpus californicus</i> (Banks) [BRVPAU]
<i>Cecidophyopsis ribis</i> (Westwood) [ERPHRI]
<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
<i>Oligonychus perditus</i> (Pritchard & Baker) [OLIGPD]

<i>Phyllocoptes fructiphilus</i> (Keifer) [PHYCFR]
<i>Tetranychus mexicanus</i> (McGregor) [TETRME]

3) Nematodlar

<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> (Franklin) [APLOBL]
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Bührer [APLORI]
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bührer) Nickle [BURSXY]
<i>Heterodera elachista</i> (Ohshima) [HETDEL]
<i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe) [HETDGL]
<i>Heterodera zaeae</i> (Koshy, Swarup & Sethi) [HETDZE]
<i>Hirschmanniella</i> spp. (Luc & Goodey) [HIRSG]
<i>Litylenchus crenatae mccannii</i> (Carta et al.) [LITYMC]
<i>Longidorus diadecturus</i> (Eveleigh ve Allen) [LONGDI]
<i>Nacobbus aberrans sensu lato</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOPA]
<i>Pratylenchus vulnus</i> (Allen & Jensen) [PRATVU]
<i>Punctodera chalconensis</i> (Stone, Sosa Moss & Mulvey) [PUNCCH]
<i>Radopholus similis citrus race</i> (Hüttel, Dickson & Kaplan) [RADOCl]
<i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> (Cobb) [XIPHAA]
<i>Xiphinema bricolense</i> (Ebsary, Vrain & Graham) [XIPHBC]
<i>Xiphinema californicum</i> (Lamberti & Bleve-Zacheo) [XIPHCA]
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Xiphinema intermedium</i> (Lamberti & Bleve-Zacheo) [XIPHIM]
<i>Xiphinema neoamericanum</i> (Saxena, Chhabra & Joshi) [XIPHNA]
<i>Xiphinema rivesi</i> (Dalmasso) [XIPHRI]
<i>Xiphinema tarjanense</i> (Lamberti ve Bleve-Zacheo) [XIPHTA]

4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

<i>Buckland valley grapevine yellows phytoplasma</i> [PHYP77]
<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> (Jagoueix et al.) [LIBEAF]
<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> (Jagoueix et al.) [LIBEAS]
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> (Zreik et al.) [PHMBFR]
<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> (Davis et al.) [PHYPPN]
<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i> (Lee et al.) [PHYPUL]
<i>Clavibacter insidiosus</i> (McCulloch) Li et al. [CORBIN]
<i>Cydonia</i> Mill. (ayva), <i>Malus</i> Mill. (elma), <i>Fragaria</i> L. (çilek), <i>Prunus</i> spp. (sert çekirdekli meyveler), <i>Pyrus</i> L. (armut), <i>Ribes</i> L. (frenk üzümü), <i>Rubus</i> L. (ahududu) ve <i>Vitis</i> L. (asma)'in aşağıda belirtilen fitoplazmaları:
1. <i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i> -related strains (<i>Pear decline Taiwan II</i> , <i>Crotalaria witches' broom phytoplasma</i> , <i>Sweet potato little leaf phytoplasma</i> [PHYP39])
2. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> (Davis et al.) [PHYPAU] (reference strain)
3. <i>Candidatus Phytoplasma fraxini</i> (reference strain) (Griffiths et al.) [PHYPPFR]
4. <i>Candidatus Phytoplasma hispanicum</i> (reference strain) (Davis et al.) [PHYP07]
5. <i>Candidatus Phytoplasma phoenicium</i> (Verdin et al.) [PHYPPH]

6.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-related strain (<i>North American grapevine yellows</i> , NAGYIII) (Davis et al.) [PHYPPN]
7.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (reference strain) (Jung et al.) [PHYPZI]
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>poinsettiae</i> (Starr & Pirone) Collins & Jones [CORBPO]	
<i>Dickeya dianthicola</i> (Samson et al.) [ERWICD]	
<i>Grapevine flavescence dorée phytoplasma</i> [PHYP64]	
<i>Palm lethal yellowing type syndromes</i> [PHYP56]	
<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. [ERWIST]	
<i>Paraburkholderia caryophylli</i> (Yabuuchi et al.) Sawana et al. [PSDMCA]	
<i>Peach rosette phytoplasma</i> [PHYP30]	
<i>Peach yellows phytoplasma</i> [PHYP29]	
<i>Pseudomonas avellanae</i> (Janse et al.) [PSDMAL]	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>aesculi</i> (Young et al.) [PSDMAX]	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young et al. [PSDMMP]	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al. [PSDMPE]	
<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> (Safni et al.) [RALSPS]	
<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> (Safni et al.) [RALSSC]	
<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> (Safni et al.) [RALSSI]	
<i>Solanum tuberosum</i> L. ve diğer yumru oluşturan <i>Solanum</i> spp. fitoplazmaları:	
1.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum (Lee et al.) [PHYPAE]
2.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-related strains (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)
3.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae-related strains (YN-169, YN-10G)
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-related strains (Clover yellow edge, <i>Potato purple top</i> Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COHP, -GTOP)
<i>Strawberry witches' broom phytoplasma</i> [SYWB00]	
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsetticola</i> [XANTPN]	
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	
<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]	
<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]	
<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>fuscans</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTFF]	
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>allii</i> (Kadota et al.) Constantin et al. [XANTAA]	
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>perforans</i> (Jones et al.) Constantin et al. [XANTPF]	
<i>Xanthomonas fragariae</i> (Kennedy & King) [XANTFR]	
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>gardneri</i> (Jones et al.) Morinière et al. [XANTGA]	
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]	
<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]	
<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [XYLEFA]	
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. [XANTAM]	

5) Funguslar

<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E.Müller [CRSPAN]

<i>Apiosporina morbosa</i> (Schweinitz) von Arx [DIBOMO]
<i>Atropellis</i> spp. (Zeller & Goodding) [1ATRPG]
<i>Bipolaris zeicola</i> (Stout) Shoemaker [COCHCA]
<i>Boeremia foveata</i> (Foister) Aveskamp et al. [PHOMEF]
<i>Boeremia linicola</i> (Naumov&Vassiljevsky) Jayawardena et al. [PHOMEL]
<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka [PHYOPI]
<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer et al. [CERAFA]
<i>Cadophora gregata</i> (Allington & D.W. Chamberlain) T.C. Harrington & McNew [PHIAGR]
<i>Chondrostereum purpureum</i> (Persoon) Pouzar [STERPU]
<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> (Dietel) [CHMYAR]
<i>Ciborinia camelliae</i> (Kohn) [SCLECA]
<i>Claviceps africana</i> (Frederickson et al.) [CLAVAF]
<i>Colletotrichum acutatum sensu lato</i> (J.H. Simmonds) [COLLAC]
<i>Colletotrichum gossypii</i> (Southworth) [GLOMGO]
<i>Colletotrichum lini</i> (Westerdijk) Tochinai [COLLLI]
<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
<i>Cronartium</i> spp. (Fries) [1CRONG]
<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer et al. [CERAVI]
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos et al. [DIAPPC]
<i>Diaporthe sojae</i> (Lehman) [DIAPPS]
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]
<i>Diaporthe vaccinii</i> (Shear) [DIAPVA]
<i>Dothistroma pini</i> (Hulbary) [DOTSPI]
<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenberg) Rogers & Yu [HYPOMA]
<i>Erysiphe grossulariae</i> (Wallroth) de Bary [MCRSGR]
<i>Fusarium ambrosium</i> (Gadd & Loos) Agnihotrudu & Nirenberg [FUSAAM]
<i>Fusarium circinatum</i> (Nirenberg & O'Donnell) [GIBBCI]
<i>Fusarium euwallaceae</i> (S. Freeman et al.) [FUSAEW]
<i>Fusarium foetens</i> (Schroers & al.) [FUSAFO]
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Killian & Maire) Malençon [FUSAAL]
<i>Geosmithia morbida</i> (Kolarik et al.) [GEOHMO]
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]
<i>Grosmannia wageneri</i> (Goheen & F.W. Cobb) Zipfel et al. [LEPGWA]
<i>Heterobasidion irregulare</i> (Garbelotto & Orosina) [HETEIR]
<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
<i>Melampsora medusae</i> (von Thümen) [MELMME]
<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Ito et al.) Crous [MYCOLL]
<i>Neofabraea malicorticis</i> (Jackson) [PEZIMA]
<i>Neofabraea vagabunda</i> (Desmazières) Rossman [PEZIAL]
<i>Neofusicoccum laricinum</i> (Sawada) Y. Hattori & C. Nakashima [GUIGLA]
<i>Neonectria neomacrospora</i> (C. Booth & Samuels) Mantiri & Samuels [NECTMA]
<i>Ophiognomonium clavignenti-juglandacearum</i> (Nair et al.) Broders & Boland [SIROCJ]
<i>Peronospora sparsa</i> (Berkeley) [PSPESR]
<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma [PHIACI]

<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Aa [GUIGCI]
<i>Phyllosticta solitaria</i> (Ellis & Everhart) [PHYSSL]
<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Shear) Hennebert [PHMPOM]
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]
<i>Phytophthora cinnamomi</i> (Rands) [PHYTCN]
<i>Phytophthora fragariae</i> (C.J. Hickman) [PHYTFR]
<i>Phytophthora kernoviae</i> (Brasier et al.) [PHYTKE]
<i>Phytophthora lateralis</i> (Tucker & Milbrath) [PHYTLA]
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]
<i>Phytophthora ramorum</i> (Werres et al.) [PHYTRA]
<i>Phytophthora rubi</i> (Man in t Veld) [PHYTFU]
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]
<i>Pseudocercospora angolensis</i> (Carvalho & Mendes) Crous & Braun [CERCAN]
<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
<i>Puccinia hemerocallidis</i> (von Thümen) [PUCCHM]
<i>Puccinia pittieriana</i> (Hennings) [PUCOPT]
<i>Pucciniastrum minimum</i> (Schweinitz) Arthur [THEKMI]
<i>Ramularia endophylla</i> (Verkley & U. Braun) [RAMUEN]
<i>Sclerophora pallida</i> (Persoon) Yao & Spooner [SKLPPA]
<i>Septoria malagutii</i> (Ciccarone & Boerema ex E.T. Cline) [SEPTLM]
<i>Sirococcus tsugae</i> (Rossman et al.) [SIROTS]
<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg et al. [MYCOPP]
<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp et al. [PHOMAN]
<i>Stagonosporopsis chrysanthemi</i> (F. Stevens) P.W. Crous et al. [MYCOLG]
<i>Stagonosporopsis crystalliniformis</i> (Loerakker et al.) Aveskamp et al. [STGSCR]
<i>Stegophora ulmea</i> (Fries) Sydow & P.Sydow [GNOMUL]
<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton [DIPDMC]
<i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton [DIPDMA]
<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
<i>Tilletia barclayana</i> (Brefeld) Saccardo & Sydow [TILLBA]
<i>Tilletia indica</i> (Mitra) [NEOVIN]
<i>Venturia nashicola</i> (Tanaka & Yamamoto) [VENTNA]
<i>Verticillium nonalfalfae</i> hop strains (Inderbitzin et al.) [VERTAH]

6) Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Arracacha virus B [AVB000]
Banana bunchy top virus [BBTV00]
Banana streak virus [BSV000]
Barley stripe mosaic virus [BSMV00]
Bean golden mosaic virus [BGMV00]
Bean yellow mosaic virus [BYMV00]
Blueberry scorch virus [BLSCV0]
Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

Citrus blight agent [CSB000]	
Citrus chlorotic spot virus [CICSV0]	
Citrus leprosis disease [CIL00]:	
1.	Citrus leprosis virus C [CILVC0]
2.	Citrus leprosis virus C2 [CILVC2]
3.	Citrus leprosis virus N [CILVN0]
4.	Hibiscus green spot virus 2 [HGSV20]
5.	Orchid fleck virus [OFV000]
Citrus mosaic virus [CMBV00]	
Citrus yellow vein clearing virus [CSYV00]	
Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]	
Columnnea latent viroid [CLVD00]	
Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]	
Cucumber green mottle mosaic virus [CGMMV0]	
Euphorbia mosaic virus [EUMV00]	
Impatiens necrotic spot virus [INSV00]	
Kyuri green mosaic virus [KGMMV0]	
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	
Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]	
Little cherry virus 2 [LCHV20]	
Melon necrotic spot virus [MNSV00]	
Melon yellowing-associated virus [MYAV00]	
Papaya ringspot virus [PRSV00]	
Pepper chat fruit viroid [PCFVD0]	
Pepper mild tigré virus [PEPMTV]	
Potato mop-top virus [PMTV00]	
Potato virus V [PVV000]	
Potato yellow dwarf virus [PYDV00]	
Rose rosette virus [RRV000]	
Squash leaf curl virus [SLCV00]	
Squash vein yellowing virus [SQVYVX]	
Tobacco rattle virus [TRV000]	
Tobacco streak virus [TSV000]	
Tobacco streak virus black raspberry latent strain [TSVBL0]	
Tomato apical stunt viroid [TASVD0]	
Tomato chlorotic dwarf viroid [TCDVD0]	
Tomato chocolate virus [TOCHV0]	
Tomato infectious chlorosis virus [TICV00]	
Tomato marchitez virus [TOANV0]	
Tomato mild mottle virus [TOMMOV]	
Tomato mottle mosaic virus [TOMMV0]	
Tomato mottle virus [TOMOV0]	
Tomato planta macho viroid [TPMVD0]	
Tomato severe rugose virus [TOSRV0]	
Tomato torrado virus [TOTV00]	
Zucchini green mottle mosaic virus [ZGMMV]	

Cydonia Mill. (ayva), *Malus* Mill. (elma), *Fragaria* L. (çilek), *Prunus* spp. (sert çekirdekli meyveler), *Pyrus* L. (armut), *Ribes* L. (frenk üzümü), *Rubus* L. (ahududu) ve *Vitis* L. (asma)'in aşağıda belirtilen virüs, viroid:

1.	American plum line pattern virus [APLPV0]
2.	Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]
3.	Apple necrotic mosaic virus [APNMV0]
4.	Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]
5.	Cheravirus avii [CRLV] [CRLV00]
6.	Cherry rosette virus [CRV000]
7.	Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]
8.	Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]
9.	Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]
10.	Grapevine red blotch virus [GRBAV0]
11.	Grapevine vein clearing virus [GVCV00]
12.	Peach mosaic virus [PCMV00]
13.	Raspberry leaf curl virus [RLCV00]
14.	Strawberry chlorotic fleck-associated virus [SCFAV0]
15.	Strawberry crinkle virus [SCRV00]
16.	Strawberry latent C virus [STLCV0]
17.	Strawberry leaf curl virus [STWLVCV]
18.	Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]
19.	Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]
20.	Strawberry vein banding virus [SVBV00]
21.	Temperate fruit decay-associated virus [TFDAV0]
22.	Watermelon silver mottle virus [WMSMOV]

Solanum tuberosum L. ve diğer yumru oluşturan *Solanum* spp. virüsleri, viroidleri:

1.	Andean potato latent virus [APLV00]
2.	Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]
3.	Andean potato mottle virus [APMOV0]
4.	Chilli leaf curl virus [CHILCU]
5.	Potato black ringspot virus [PBRV0]
6.	Potato virus B [PVB000]
7.	Potato virus H [PVH000]
8.	Potato virus P [PVP000]
9.	Potato virus T [PVT000]
10.	Potato yellow mosaic virus [PYMV00]
11.	Potato yellow vein virus [PYVV00]
12.	Potato yellowing virus [PYV000]
13.	Tomato mosaic Havana virus [THV000]

7) Yabancı otlar

<i>Acer rufinerve</i> (Siebold & Zuccarini) [ACRRU]
<i>Ageratina adenophora</i> (Sprengel) King & Robinson [EUPAD]
<i>Aizoon pubescens</i> (Eckler & Zeyher) [GAJPU]
<i>Akebia quinata</i> (Houttuyn) Decaisne [AKEQI]

<i>Alternanthera philoxeroides</i> (von Martius) Grisebach [ALRPH]
<i>Amaranthus tuberculatus</i> (Moquin-Tandon) Sauer [AMATU]
<i>Ambrosia confertiflora</i> (de Candolle) [FRSCO]
<i>Ambrosia trifida</i> (Linnaeus) [AMBTR]
<i>Andropogon virginicus</i> (Linnaeus) [ANOVI]
<i>Alternanthera pungens</i> (Kunth) [ALRRE]
<i>Araujia sericifera</i> (Brotero) [AJASE]
<i>Arceuthobium</i> spp. (Marschall von Bieberstein) [IAREG]
<i>Arctotheca calendula</i> (Linnaeus) Levyns [AROCA]
<i>Asparagus asparagoides</i> (Linnaeus) Druce [ASPAS]
<i>Baccharis halimifolia</i> (Linnaeus) [BACHA]
<i>Baccharis spicata</i> (Lamarck) Baillon [BACSP]
<i>Bidens subalternans</i> (de Candolle) [BIDSU]
<i>Broussonetia papyrifera</i> (Linnaeus) Ventenat [BRNPA]
<i>Cardiospermum grandiflorum</i> (Swartz) [CRIGR]
<i>Cenchrus longispinus</i> (Hackel) Fernald [CCHLO]
<i>Celastrus orbiculatus</i> (Thunberg) [CELOR]
<i>Cotula coronopifolia</i> (Linnaeus) [CULCO]
<i>Cornus sericea</i> (Linnaeus) [CRWSR]
<i>Cortaderia jubata</i> (Lemoine ex Carrière) Stapf [CDTJU]
<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne [CSBHE]
<i>Delairea odorata</i> (Lemaire) [SENMI]
<i>Ehrharta calycina</i> (Smith) [EHRCA]
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunberg) Kunth [ERBVI]
<i>Fallopia baldschuanica</i> (Regel) Holub [BIKBA]
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirbel [GUATI]
<i>Gymnocoronis spilanthoides</i> (D. Don ex Hooker) de Candolle [GYNSP]
<i>Hakea sericea</i> (Schrader) [HKASE]
<i>Heracleum sosnowskyi</i> (Mandenova) [HERSO]
<i>Humulus scandens</i> (Loureiro) Merrill [HUMJA]
<i>Hydrilla verticillata</i> (Linnaeus) Royle [HYLLI]
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> (C. Linnaeus) [HYDRA]
<i>Hygrophila polysperma</i> (Roxburgh) Anderson [HYGPO]
<i>Impatiens edgeworthii</i> (J.D. Hooker) [IPAED]
<i>Impatiens parviflora</i> (de Candolle) [IPAPA]
<i>Iva axillaris</i> (Pursh) [IVAAX]
<i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont de Courset) G. Don [LESCU]
<i>Linnophila sessiliflora</i> (Vahl) von Blume [LIOSE]
<i>Lycium ferocissimum</i> (Miers) [LYUFE]
<i>Lygodium japonicum</i> (Thunberg) Swartz [LYFJA]
<i>Lysichiton americanus</i> (Hultén & St-John) [LSYAM]
<i>Miscanthus sinensis</i> (Andersson) [MISSI]
<i>Myriophyllum heterophyllum</i> (Michaux) [MYPHE]
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vellozo) Verdcourt [MYPBR]
<i>Neltuma juliflora</i> (Swartz) Rafinesque [PRCJU]
<i>Parthenium hysterophorus</i> (Linnaeus) [PTNHY]

<i>Pennisetum setaceum</i> (Forsskål) Morrone [PESSA]
<i>Pistia stratiotes</i> (Linnaeus) [PIIST]
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis [PRCCH]
<i>Prosopis glandulosa</i> (Torrey) Britton & Rose [PRCJG]
<i>Prosopis velutina</i> (Wooton) Britton & Rose [PRCJV]
<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (Willdenow) Sanjappa & Pradeep [PUELO]
<i>Senecio brasiliensis</i> (Sprengel) Lessing [SENBR]
<i>Sesbania punicea</i> (Cavanilles) Bentham [SEBPU]
<i>Solanum carolinense</i> (Linnaeus) [SOLCA]
<i>Solanum rostratum</i> (Dunal) [SOLRS]
<i>Solanum triflorum</i> (Nuttall) [SOLTR]
<i>Solidago nemoralis</i> (Aiton) [SOONE]
<i>Nassella trichotoma</i> (Nees) Arechavaleta [STDTR]
<i>Stipa neesiana</i> (Trinius & Ruprecht) Barkworth [STDNE]
<i>Nassella tenuissima</i> (Trinius) Barkworth [STDTN]
<i>Striga lutea</i> (Linnaeus) Kuntze [STRLU]
<i>Striga hermonthica</i> (Delile) Bentham [STRHE]
<i>Striga gesnerioides</i> (Willdenow) Engler [STRGE]
<i>Spiraea alba</i> (Duroi) [SPVAB]
<i>Spiraea douglasii</i> (Hooker) [SPVDO]
<i>Spiraea tomentosa</i> (Linnaeus) [SPVTO]
<i>Triadica sebifera</i> (Linnaeus) Small [SAQSE]

İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN VE TÜRKİYE'DE SINIRLI OLARAK BULUNAN
KARANTİNAYA TABİ ZARARLI ORGANİZMALAR

1) Böcekler

<i>Agrilus bilineatus</i> (Weber) [AGRLBL]
<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
<i>Aleurothrix floccosus</i> (Maskell) [ALTHFL]
<i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) [ANOLCN]
<i>Aonidiella citrina</i> (Coquillett) [AONDCI]
<i>Aulacaspis tubercularis</i> (Newstead) [AULSTU]
<i>Bactorecera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]
<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius) [BEMITA]
<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner) [TORTPR]
<i>Cacyreus marshalli</i> (Butler) [CACYMA]
<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) [CERTCA]
<i>Ceroplastes japonicus</i> (Green) [CERPJA]
<i>Ceroplastes rusci</i> (Linnaeus) [CERPRU]
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell) [CHTSFR]
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) [PLUSCH]
<i>Chrysomphalus aonidium</i> (Linnaeus) [CHRYFI]
<i>Circulifer tenellus</i> (Baker) [CIRCTE]
<i>Comstockaspis perniciosa</i> (Comstock) [QUADPE]
<i>Curculio glandium</i> (Marsham) [CURCGL]
<i>Dacus ciliatus</i> (Loew) [DACUCI]
<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) [VITEVI]
<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann) [DENCMI]
<i>Deudorix isocrates</i> (Fabricius) [VIRAIS]
<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> (Leconte) [DIABVI]
<i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura) [DROSSU]
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu) [DRYCKU]
<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret) [EPIDBE]
<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann) [ERISLA]
<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) [FRANOC]
<i>Garella musculana</i> (Erschov) [ERSHMU]
<i>Halyomorpha halys</i> (Stål) [HALYHA]
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) [HELIAR]
<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock) [HEBERA]
<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal) [IPSXAC]
<i>Ips amitinus</i> (Eichhoff) [IPSXAM]
<i>Ips cembrae</i> (Heer) [IPSXCE]
<i>Ips duplicatus</i> (Sahlberg) [IPSXDU]
<i>Ips sexdentatus</i> (Börner) [IPXSSE]
<i>Ips typographus</i> (Linnaeus) [IPSXTY]
<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) [LIRIBO]

<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) [LIRIHU]
<i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) [LIRISA]
<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) [LIRITR]
<i>Lopholeucaspis japonica</i> (Cockerell) [LOPLJA]
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus) [LYMAMO]
<i>Merodon equestris</i> (Fabricius) [LAMTEQ]
<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) [CARYPA]
<i>Neoliturus haematoceps</i> (Mulsant & Rey) [NEOAHA]
<i>Pammene fasciana</i> (Linnaeus) [PAMMFA]
<i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) [PRABMY]
<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner) [SAISNI]
<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders) [PECTGO]
<i>Pentalonia nigronervosa</i> (Coquerel) [PENLNI]
<i>Phthorimaea operculella</i> (Zeller) [PHTOOP]
<i>Pissodes castaneus</i> (DeGeer) [PISONO]
<i>Pityokteines curvidens</i> (Germar) [PITKCU]
<i>Pochazia shantungensis</i> (Chou & Lu) [POCZSH]
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti) [PSEAPE]
<i>Psylla</i> spp. (Geoffroy) [1PSYLG]
<i>Rhagoletis cerasi</i> (Linnaeus) [RHAGCE]
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]
<i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood) [SCITDO]
<i>Singhiella simplex</i> (Singh) [SINLSI]
<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
<i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval) [SPODLI]
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus) [THAUPR]
<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) [GNORAB]
<i>Xylosandrus crassiusculus</i> (Motschulsky) [XYLBCR]

2) Akarlar

<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein) [EUTEOR]
<i>Phytonemus pallidus</i> (Banks) [TARSPA]
<i>Phytoptus avellanae</i> (Nalepa) [ERPHAV]
<i>Tetranychus evansi</i> (Baker & Pritchard) [TETREV]
<i>Tetranychus urticae</i> (Koch) [TETRUR]

3) Nematodlar

<i>Aphelenchoides besseyi</i> (Christie) [APLOBE]
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]
<i>Ditylenchus destructor</i> (Thorne) [DITYDE]
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
<i>Heterodera fici</i> (Kirjanova) [HETDFI]

<i>Longidorus</i> spp. (Micoletskii) [LLONGG]
<i>Meloidogyne</i> spp. (Goeldi) [IMELGG]
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]
<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne [RADOSI]
<i>Rotylenchulus reniformis</i> (Linford & Oliveira) [ROTYRE]
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> (Cobb) [TYLESE]
<i>Xiphinema index</i> (Thorne & Allen) [XIPHIN]

4) Prokaryotlar (bakteri ve fitoplazmalar)

<i>Acidovorax citrulli</i> (Schaad et al.) Schaad et al. [PSDMAC]
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> (Liefting et al.) [LIBEPS]
<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> (Lee et al.) [PHYPPAS]
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> (Seemüller & Schneider) [PHYPPMA]
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> (Seemüller & Schneider) [PHYPPR]
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> (Seemüller & Schneider) [PHYPPY]
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> (Quaglino et al.) [PHYPSO]
<i>Candidatus Phytoplasma trifolii</i> (Hiruki & Wang) [PHYPTR]
<i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]
<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Li et al. [CORBSE]
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
<i>Dickeya solani</i> (van der Wolf et al.) [DICKSO]
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> (Takikawa et al.) [PSDMAK]
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) Young et al. [PSDMPI]
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]
<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]
<i>Rhizobium vitis</i> (Opel & Kerr) Young et al. [AGRBTU]
<i>Rhodococcus fascians</i> (Tilford) [CORBFA]
<i>Spiroplasma citri</i> (Saglio et al.) [SPIRCI]
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> (Miller et al.) Vauterin et al. [XANTCY]
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>juglandis</i> (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (McCulloch & Pirone) Vauterin et al. [XANTDF]
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>euvesicatoria</i> (Jones et al.) Constantin et al. [XANTEU]
<i>Xanthomonas phaseoli</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Constantin et al. [XANTPH]
<i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> (Jones et al.) Vauterin et al. [XANTTR]
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

5) Funguslar

<i>Alternaria linicola</i> (Groves & Skolko) [ALTELI]
<i>Alternaria mali</i> (Roberts) [ALTEMA]
<i>Apiognomonina</i> (Höhnle) [APIGG]
<i>Ceratocystis platani</i> (Walter) Engelbrecht & Harrington [CERAFP]

<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]
<i>Dematophora necatrix</i> (R.Hartig) [ROSLNE]
<i>Discula</i> spp. (Saccardo) [1DISCG]
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]
<i>Elsinoë</i> spp. (Raciborski) [1ELSIG]
<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> (E.F.Smith) Snyder & Hansen [FUSACB]
<i>Gymnosporangium</i> spp. (R. Hedwig ex DeCandolle) [1GYMNG]
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]
<i>Monilinia fructicola</i> (G. Winter) Honey [MONIFC]
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]
<i>Phytophthora cryptogea</i> (Pethybridge & Lafferty) [PHYTCR]
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter et al. [DEUTTR]
<i>Puccinia horiana</i> (Hennings) [PUCCHN]
<i>Stromatinia cepivora</i> (Berkeley) Whetzel [SCLOCE]
<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival [SYNCEN]
<i>Tilletia caries</i> (de Candolle) Tulasne & C.Tulasne [TILLCA]
<i>Tilletia controversa</i> (Kühn) [TILLCO]
<i>Tilletia laevis</i> (Kühn) [TILLFO]
<i>Verticillium alboatrum sensu lato</i> (Reinke & Berthold) [VERTAA]
<i>Verticillium dahliae</i> (Klebahn) [VERTDA]

6) Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar ve Viroidler

Apple mosaic virus [APMV00]
Apple stem grooving virus [ASGV00]
Arabis mosaic virus [ARMV00]
Beet curly top virus [BCTV00]
Beet leaf curl virus [BLCV00]
Beet necrotic yellow vein virus [BNYVV00]
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]
Citrus psorosis virus [CPSV00]
Cherry leaf roll virus [CLRV00]
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]
Citrus tristeza virus [CTV000]
Citrus vein enation virus [CVEV00]
Cucumber vein yellowing virus [CVYV00]
Cucurbit yellow stunting disorder virus [CYSVDV0]
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]
Grapevine fleck virus [GFKV00]
Grapevine leafroll-associated virus [GLRAV]
Grapevine rupestris stem pitting-associated virus [GVRSP0]
Little cherry virus 1 [LCHV10]
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]
Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]
Plum pox virus [PPV000]
Potato leafroll virus [PLRV00]
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]
Potato virus A [PVA000]
Potato virus M [PVM00]
Potato virus S [PVS000]
Potato virus X [PVX000]
Potato virus Y (Yo, Yn, Yntn ve Yc dahil) [PVY000]
Prune dwarf virus [PDV000]
Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]
Satsuma dwarf virus [SDV000]
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]
Tomato black ring virus [TBRV00]
Tomato brown rugose fruit virus [TOBRFV]
Tomato chlorosis virus [TOCV00]
Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]
Tomato ringspot virus [TORSV0]
Tobacco ringspot virus [TRSV00]
Tomato spotted wilt virus [TSWV00]
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

7) Yabancı otlar

<i>Alternanthera sessilis</i> (Linnaeus) de Candolle [ALRSE]
<i>Amaranthus palmeri</i> (Watson) [AMAPA]
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (Linnaeus) [AMBEL]
<i>Cuscuta</i> spp. [1CVCG]
<i>Eloдея muttallii</i> (Planchon) St-John [ELDNU]
<i>Heraclеum persicum</i> (Fischer) [HERPE]
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux) Greuter & Burdet [LUDUR]
<i>Ludwigia pеploides</i> (Kunth) Raven [LUDPE]
<i>Microstegium vimineum</i> (Trinius) A.Camus [MCGVI]
<i>Persicaria perfoliata</i> (Linnaeus) [POLPF]
<i>Pontederia crassipes</i> (von Martius) [EICCR]
<i>Salvinia molesta</i> (Mitchell) [SAVMO]
<i>Sida spinosa</i> (Linnaeus) [SIDSP]
<i>Solanum elaeagnifolium</i> (Cavanilles) [SOLEL]
<i>Spirodela punctata</i> (Meyer) Thompson [SPIPU]

TÜRKİYE'YE GİRİŞİ YASAK BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER

Sıra No:	BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER	MENŞEİ ÜLKELER
1.	Toprak	Tüm ülkeler
2.	Tabii gübre	Tüm ülkeler
3.	Kütlü pamuk	Tüm ülkeler
4.	Pinopsida odunları (Yakacak amaçlı)	Tüm ülkeler
5.	<i>Castanea</i> Mill. izole edilmiş kabukları	Tüm ülkeler
6.	Daha önce tarımda kullanılmış <i>Cocos nucifera</i> lifinden oluşan bitki yetiştirme materyali	Tüm ülkeler
7.	<i>Solanum tuberosum</i> L. hariç, dikim amaçlı <i>Solanum</i> L. türlerinin stolon veya yumru oluşturan bitkileri veya melezleri	Tüm ülkeler
8.	Dikim amaçlı olan <i>Solanum</i> L. türlerinin stolon veya yumru oluşturan bitkileri veya melezleri haricinde <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	<i>Clavibacter sepedonicus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler
9.	Tohum ve meyve hariç <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., x <i>Citrofortunella microcarpa</i> (Bunge) Wijnands dikim amaçlı bitkileri ve bunların melezleri	Tüm ülkeler
10.	Tohum ve meyve hariç <i>Populus</i> L., yapraklı bitkileri	Kanada, Meksika, ABD
11.	<i>Quercus</i> L. ve <i>Acer saccharum</i> , izole edilmiş kabukları	Kanada, Meksika, ABD
12.	Dikim amaçlı, yaprağı çiçeği ve meyvesi olmayan uyku halindeki <i>Photinia</i> Ldl. bitkisi	ABD, Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
13.	<i>Populus</i> L. izole edilmiş kabukları	Amerika Kıtası ülkeleri
14.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Coffea</i> L. bitkileri	Kostarika ve Honduras
15.	Taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan Palmae familyası bitkileri <i>Cocos nucifera</i> <i>Elaeis guineensis</i> <i>Euterpe edulis</i> <i>Metroxylon sagu</i> <i>Phoenix canariensis</i> <i>Phoenix dactylifera</i> <i>Saccharum officinarum</i> <i>Ananas comosus</i> <i>Annona reticulata</i> <i>Artocarpus altilis</i> <i>Carica papaya</i> <i>Citrus</i> spp. <i>Mangifera indica</i> <i>Musa</i> spp. <i>Persea Americana</i> <i>Psidium guajava</i> <i>Theobroma cacao</i>	<i>Rhynchophorus palmarum</i> varlığı bilinen ülkeler

16.	<p>Taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan Palmae familyası bitkileri</p> <p><i>Areca catechu</i> <i>Arenga pinnata</i> <i>Borassus flabellifer</i> <i>Caryota maxima</i> <i>Caryota cumingii</i> <i>Cocos nucifera</i> <i>Corypha gebanga</i> <i>Corypha elata</i> <i>Elaeis guineensis</i> <i>Livistona decipiens</i> <i>Livistona chinensis</i> <i>Livistona subglobosa</i> <i>Metroxylon sagu</i> <i>Oneosperma horrida</i> <i>Oneosperma tigillaria</i> <i>Oreodoxa regia</i> <i>Phoenix canariensis</i> <i>Phoenix dactylifera</i> <i>Phoenix sylvestris</i> <i>Sabal umbraculifera</i> <i>Trachycarpus fortunei</i> <i>Washingtonia sp.</i></p>	<p><i>Rhynchophorus ferrugineus</i> varlığı bilinen ülkeler</p>
17.	<p>Dikim amaçlı <i>Musa</i> sp. bitkileri</p>	<p><i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> varlığı bilinen ülkeler</p>
18.	<p><i>Acacia</i> Mill. <i>Acer</i> L., <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castrov.) Castrov. <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia</i> L. <i>Ampelopsis arborea</i> (L.) Koehne <i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. <i>Ampelopsis cordata</i> Michx. <i>Anthyllis barba-jovis</i> L. <i>Anthyllis hermanniae</i> L. <i>Arbutus unedo</i> L. <i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch. Bip. <i>Artemisia</i> L. <i>Asparagus acutifolius</i> L. <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth <i>Baccharis</i> L. <i>Berberis thunbergii</i> DC. <i>Brassica</i> L. <i>Calicotome spinosa</i> (L.) Link <i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link <i>Callicarpa americana</i> L.</p>	<p><i>Xylella fastidiosa</i>'nın varlığı bilinen ülkelerin bulaşık üretim alanları</p>

Calluna vulgaris (L.) Hull
Calocephalus brownii (Cass.) F. Muell.
Carya Nutt.
Catharanthus roseus (L.) G. Don
Celtis occidentalis L.
Cercis canadensis L.
Cercis occidentalis Torr.
Cercis siliquastrum L.
Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene
Chenopodium album L.
Chionanthus L.
x *Chitalpa tashkentensis* T. S. Elias & Wisura
Cistus L.
Citrus L.
Clematis cirrhosa L.
Clematis vitalba L.
Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash
Coffea L.
Conium maculatum L.
Convolvulus cneorum L.
Coprosma repens A. Rich.
Coronilla L.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus Desf.
Digitaria Haller
Dimorphotheca ecklonis (DC.) Norl.
Dimorphotheca fruticosa (L.) Norl.
Diospyros kaki L. f.
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.
Echium plantagineum L.
Elaeagnus angustifolia L.
Elaeagnus x submacrophylla Servett.
Encelia farinosa A. Gray ex Torr.
Eremophila maculata (Ker Gawler) F. von Müller.
Erica cinerea L.
Erigeron L.
Eriocephalus africanus L.
Erodium moschatum (L.) L'Hérit.
Erysimum L.
Euphorbia chamaesyce L.
Euphorbia terracina L.
Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord.
Euryops pectinatus (L.) Cass.
Fagus crenata Blume
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.
Ficus carica L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus L.
Gazania rigens (L.) Gaertn.
Genista L.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia triacanthos L.
Grevillea juniperina Br.
Hebe Comm. ex Juss.
Helianthus L.
Helichrysum Mill.
Heliotropium europaeum L.
Hemerocallis L.
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll. Arg.
Hibiscus L.
Humulus scandens (Lour.) Merr.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum perforatum L.
Ilex aquifolium L.
Ilex vomitoria Sol. ex Aiton
Iva annua L.
Jacaranda mimosifolia D. Don
Jacobaea maritima (L.) Pelsler & Meijden
Juglans L.
Juniperus ashei J. Buchholz
Koelreuteria bipinnata Franch.
Lagerstroemia L.
Laurus nobilis L.
Lavandula L.
Lavatera cretica L.
Ligustrum lucidum W. T. Aiton.
Liquidambar styraciflua L.
Lonicera implexa Soland.
Lonicera japonica Thunb.
Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner
Lupinus villosus Willd.
Magnolia grandiflora L.
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.
Mallotus paniculatus (Lam.) Müll. Arg.
Medicago arborea L.
Medicago sativa L.
Melaleuca citrina (Curtis) Dumont de Courset
Metrosideros Banks ex Gaertn.
Mimosa L.
Modiola caroliniana (L.) G. Don
Morus L.
Myoporum insulare R. Br.

Myoporum laetum G. Forst.
Myrtus communis L.
Nandina domestica Murray
Neptunia lutea (Leavenw.) Benth.
Nerium oleander L.
Olea L.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Paspalum dilatatum Poir.
Pelargonium L'Hér. ex Aiton
Perovskia abrotanoides Kar.
Persea americana Mill.
Phagnalon saxatile (L.) Cass.
Phillyrea angustifolia L.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phlomis italica L.
Phoenix reclinata Jacquin
Phoenix roebelenii O'Brien
Pinus taeda L.
Pistacia vera L.
Plantago lanceolata L.
Platanus L.
Pluchea odorata (L.) Cass.
Polygala grandiflora Wight
Polygala myrtifolia L.
Prunus L.
Psidium L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pyrus L.
Quercus L.
Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
Retama monosperma (L.) Boiss.
Rhamnus L.
Rhus L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa L.
Rubus L.
Ruta chalepensis L.
Ruta graveolens L.
Salvia apiana Jeps.
Salvia mellifera Greene
Salvia officinalis L.
Salvia rosmarinus Spenn.
Sambucus L.
Santolina chamaecyparissus L.
Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P. Monts.) Romo
Sapindus saponaria L.
Sassafras L. ex Nees

Scabiosa atropurpurea var. *Maritima* L.
Setaria magna Griseb.
Solidago fistulosa Mill.
Solidago virgaurea L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spartium L.
Stewartia pseudocamellia Maxim.
Strelitzia reginae Aiton
Streptocarpus Lindl.
Symphotrichum divaricatum (Nutt.) G. L. Nesom
Syringa vulgaris L.
Teucrium capitatum L.
Thymus vulgaris L.
Trifolium repens L.
Ulex L.
Ulmus L.
Vaccinium L.
Viburnum tinus L.
Vinca L.
Vitex agnus-castus L.
Vinca minör L.
Vitis L.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce
Westringia glabra R.Br.
Xanthium strumarium L. tohum hariç dikim amaçlı bitkileri

BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

Sıra no:	Bitki bitkisel ürün ve diğer maddeler	Menşee	Özel şartlar
1.	İn vitro bitkilerin steril ortamı hariç, bitkilerin canlılığını sürdürebilmeleri amaçlanan, bitkilerle birlikte bulunan veya bitkilerle ilişkili yetiştirme ortamı	Tüm ülkeler	<p>a) Dikim amındaki yetiştirme ortamı;</p> <p>(i) Toprak ve organik maddelerden ari olması ve daha önce bitki yetiştirmek için ya da herhangi bir tarımsal amaç için kullanılmamış olması, veya</p> <p>(ii) Yetiştirme ortamı tamamen turba veya fiber <i>Cocos nucifera</i> L.'dan oluşuyorsa, daha önce bitki yetiştirmek için ya da herhangi bir tarımsal amaç için kullanılmamış olması, veya</p> <p>(iii) Böcekler ve zararlı nematodlardan ari bulunduğu ve diğer zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için uygun bir incelemeye veya ısı muamelesine veya fümigasyon işlemine tabi tutulmuş olması, ve</p> <p>Yukarıdaki durumların hepsinde, zararlı organizmalardan korumak için uygun koşullar altında saklanmış ve muhafaza edilmiş olması,</p> <p>b) Dikimden itibaren;</p> <p>(i) Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için aşağıda belirtilen önlemlerin alınmış olması,</p> <p>–Yetiştirme ortamının topraktan ve diğer olası kirlilik kaynaklarından fiziksel izolasyonun sağlanması,</p> <p>–Hijyen önlemleri alınmış olması,</p>

			<p>-Zararlı organizmalardan arındırılmış su kullanılması, veya (ii) Sevkiyattan önceki iki haftalık süre içerisinde bitkilerin taşınmaları süresince canlılıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan en az miktarda yetiştirme ortamı kalacak şekilde silkelendiği; bitkiler tekrar dikilmiş ise, bu amaç için kullanılan yetiştirme ortamının (a) bendinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
2.	Tarım veya ormancılıkta kullanılan makine ve araçlar	Tüm ülkeler	<p>Makinelerin veya araçların dezenfekte edildiği, toprak, bitki kalıntıları ve zararlı organizmalardan arındırıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
3.	Soğanlar, yumrular, rizomlar, tohumlar, soğansılar ve doku kültüründeki bitkiler hariç dikim amaçlı bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından tescil ve denetime tabi tutulan fidanlıklarda yetiştirilmiş olduğu, ve b) Uygun zamanlarda ve ihracattan önce denetlendiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
4.	Köklü, dikili veya dikim amaçlı, açık alanda yetiştirilmiş bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) Üretim yerinin <i>Clavibacter sepedonicus</i> ve <i>Synchytrium endobioticum</i>'dan arı olduğu, ve b) <i>Globodera pallida</i> ve <i>Globodera rostochiensis</i>'den arı olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
5.	Soğanlar, yumrular, rizomlar, tohumlar, soğansılar ve doku kültüründeki bitkiler hariç dikim amaçlı bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği, ve</p>

			<p>a) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre <i>Thrips palmi</i>'den ari olarak oluşturulan bir alan menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre, <i>Thrips palmi</i>'den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki üç ay süresince yapılan resmî kontrollerde, <i>Thrips palmi</i>'den ari olarak bildirilen bir üretim yeri menşeli olduğu, veya c) İhracattan hemen önce, <i>Thrips palmi</i>'ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve resmî olarak kontrol edildiği ve <i>Thrips palmi</i>'den ari bulunduğu, veya ç) <i>Thrips palmi</i>'den ari, bitki materyalinden yapay ortamda üretildiği, <i>Thrips palmi</i> ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuvar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, bu tekniklere uygun kaplarda sevk edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
6.	Doku kültüründeki bitkiler hariç dikim amaçlı bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) <i>Meloidogyne enterolobii</i>'den ari olarak bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre denetlenen <i>Meloidogyne enterolobii</i>'den ari olarak oluşturulan bir alanda yetiştirilmiş olduğu alanın adı, veya</p>

c) Bitkilerin yaşamları boyunca veya dikimi sırasında kullanılan yetiştirme ortamının;

i) Toprak ve organik madde içermediğini ve daha önce bitki yetiştirmek veya başka herhangi bir tarımsal amaçla kullanılmadığı,

veya

ii) Yetiştirme ortamının tamamen turba veya *Cocos nucifera* L. lifinde olduğu ve daha önce bitki yetiştirmek veya başka herhangi bir tarımsal amaç için kullanılmamış olduğu,

veya

iii) *Meloidogyne enterolobii*'den arılığı sağlamak için Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilen etkin fümigasyon veya ısıtma işlemine tabi tutulmuş olduğu,

veya

iv) *Meloidogyne enterolobii*'den arılığı sağlamak için etkin mücadele yöntemine tabi tutulduğu,

ve

(i) ile (iv) maddelerinde belirtilen tüm durumlarda, *Meloidogyne enterolobii*'den ari tutmak için uygun koşullar altında saklandığı ve muhafaza edildiği ve dikimden beri bitkilerin *Meloidogyne enterolobii*'den ari tutulmasını sağlamak için uygun önlemler alındığı en azından yetiştirme ortamının topraktan ve diğer olası kontaminasyon kaynaklarından fiziksel izolasyonunun sağlandığı,

ve

-Hijyen önlemlerinin alındığı,

veya

ç) (i) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e uygun olarak

			<p>kurulan <i>Meloidogyne enterolobii</i>'den ari olarak bir üretim yeri menşeli olduğu, ve (ii) İhracattan hemen önce sevkiyatın temsili bir örneğinin kökleri ile birlikte incelendiği ve <i>Meloidogyne enterolobii</i>'nin semptomlarından ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
7.	Doku kültürü ve su bitkileri dışındaki bitkilerin canlılığını sürdürmesi amacıyla yetiştirme ortamı ile birlikte dikim amaçlı bitkiler	Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri	<p>Bitkilerin; a) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Popillia japonica</i>'dan ari olarak oluşturulan denetlenen bir alanda yetiştirilmiş olduğu ve alanın adı, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Popillia japonica</i>'dan ari olarak oluşturulan denetlenen bir üretim yerinde yetiştirilmiş olduğu, i) İhracattan önce üç ay boyunca yabancı otlar dahil tüm bitkilerin, <i>Popillia japonica</i>'nın varlığını veya herhangi bir belirtisini tespit etmek amacıyla uygun zamanlarda, yapılan yıllık resmî denetimlerin yapıldığı veya en azından aylık görsel olarak incelendiği, yabancı otlar dahil ilgili tüm bitkilerin ve bitkilerin büyüdüğü yetiştirme ortamları örneklerinin incelendiği, ve ii) <i>Popillia japonica</i>'nın bulunmadığının her yıl uygun zamanlarda yapılan resmî kontrollerde en az 100 m'lik bir tampon bölge ile çevrili bir alan dahil teyit edildiği,</p>

			<p>iii) Bitkiler ve yetiştirme ortamları ihraç edilmeden hemen önce, yetiştirme ortamının örneklenmesi de dahil olmak üzere resmî bir incelemeye tabi tutulduğu ve <i>Popillia japonica</i>'dan ari bulunduğu,</p> <p>iv) Bitkiler üretim yerinden ayrıldıktan sonra <i>Popillia japonica</i> ile bulaşmayı önleyecek şekilde paketlenmiş veya taşındığı,</p> <p>veya</p> <p>Bitkilerin <i>Popillia japonica</i>'nın uçuş sezonu dışında taşındığı,</p> <p>veya</p> <p>c) Bitkilerin yaşamları boyunca <i>Popillia japonica</i> girişine karşı fiziksel izolasyonlu bir üretim sahasında yetiştirildiği,</p> <p>i) Üretim sahasından ayrıldıktan sonra <i>Popillia japonica</i>'dan bulaşmayı önleyecek şekilde paketlenmiş veya taşındığı,</p> <p>veya</p> <p>ii) Bitkilerin <i>Popillia japonica</i>'nın uçuş sezonunun dışına taşındığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
8.	Poaceae familyasına ait bitkiler ve tohumlar hariç dikim amaçlı yıllık ve iki yıllık bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Fidanlıklarda yetiştirildiği,</p> <p>ve</p> <p>b) Bitki artığı, çiçek ve meyveden ari olduğu,</p> <p>ve</p> <p>c) İhracattan önce uygun zamanlarda incelendiği, zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların iz ve belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu,</p>

			Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
9.	Poaceae familyasının <i>Bambusoideae</i> ve <i>Panicoideae</i> alt familyasının <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adans., <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R.Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schrank, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. ve <i>Uniola</i> L. cinslerinin tohumları hariç, dikim amaçlı bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Fidanlıklarda yetiştirildiği, ve b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu, ve c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların iz ve belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
10.	<i>Bemisia tabaci</i> ile taşınan (Bean golden mosaic virus, Cowpea mild mottle virus, Lettuce infectious yellows virus, Pepper mild tigré virus, Squash leaf curl virus ve <i>Bemisia tabaci</i> ile taşınan diğer virüsler); ülkeler menşeli, tohum, yumru, soğan, soğansı, rizomları hariç, dikim amaçlı bitkileri;	<i>Bemisia tabaci</i> varlığının bilinmediği ve taşıdığı ilgili zararlı organizmaların ve diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen yerlerde, Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği yerlerde,	Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. a) Tam bir vejetasyon periyodu boyunca bitkiler üzerinde ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği, ve <i>Bemisia tabaci</i> ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Uygun zamanlarda yapılan resmî incelemelerde, üretim yerlerinin <i>Bemisia tabaci</i> ve ilgili zararlı organizmaların diğer vektörlerinden ari bulunduğu,

			<p>veya</p> <p>c) <i>Bemisia tabaci</i>'nin eradikasyonu için bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,</p> <p>veya</p> <p>ç) <i>Bemisia tabaci</i>'den ari bitki materyalinden (yapay ortamda) üretildiği; <i>Bemisia tabaci</i> ile olası bulaşmayı önlemek için steril laboratuvar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, bu tekniklere uygun kaplarda sevk edildiği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
11.	Soğanlar, yumrular, rizomlar, tohumlar, soğansılar ve doku kültüründeki ve <i>Poacea</i> familyası bitkiler hariç otsu türlerin dikim amaçlı bitkileri	<i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin fidanlıklarda yetiştirildiği,</p> <p>ve</p> <p>a) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre, <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i>'dan ari olarak oluşturulan bir alan menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre, <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i>'dan ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki 3 ay süresince yapılan resmî kontrollerde, <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i>'dan ari olarak bildirilen, bir üretim yeri menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) İhracattan hemen önce, <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i>'ya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve resmî olarak kontrol edildiği ve <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i>'dan ari bulunduğu, yapılan muamelenin detayları,</p>

			Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
12.	<i>Caryophyllaceae</i> (<i>Dianthus</i> L. hariç), <i>Asteraceae</i> (<i>Chrysanthemum</i> L. hariç), <i>Brassicaceae</i> , <i>Fabaceae</i> ve <i>Rosaceae</i> (<i>Fragaria</i> L. hariç) familyalarının, tohumları hariç, üretim amaçlı çok yıllık otsu bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Fidanlıklarda yetiştirildiği, ve b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu, ve c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların iz ve belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
13.	Doku kültürü ortamındaki tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı ağaçlar ve çalılar	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Fidanlıklarda yetiştirildiği, ve b) Bitki artıkları, çiçek ve meyvelerden ari olduğu, ve c) İhracattan önce incelenerek zararlı bakteri, virüs ve virüs benzeri organizmaların belirtisinden ari bulunduğu ve ayrıca zararlı nematod, böcek, akar ve fungusların iz ve belirtilerinden ari bulunduğu veya bu gibi zararlı organizmaları elemine etmek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
14.	Doku kültürü ortamındaki tohumları ve doku kültürü bitkileri hariç, dikim amaçlı yaprak dökken ağaçlar ve çalılar	Tüm ülkeler	Bitkilerin uykuda ve yapraksız olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
15.	Soğanlar, yumrular, rizomlar, tohumlar, soğansılar ve doku kültüründeki bitkiler hariç dikim amaçlı bitkiler	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i> 'den ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu,

			<p>veya</p> <p>b) Üretim yerinde hasattan önceki 3 ay süresince yapılan resmî kontrollerde, <i>Liriomyza bryoniae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i>'nin hiçbir belirtisinin görülmediği,</p> <p>veya</p> <p>c) İhracattan hemen önce bitkilerin resmî olarak kontrol edildiği ve <i>Liriomyza bryoniae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i>'den ari olduğunun bulunduğu ve <i>Liriomyza bryoniae</i>, <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i>'ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,</p> <p>veya</p> <p>ç) <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i>'den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda – explant) üretildiği, <i>Liriomyza huidobrensis</i> ve <i>Liriomyza trifolii</i> ile olası kontaminasyonu önlemek için, steril laboratuvar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, bu tekniklere uygun kaplarda sevk edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
16.	Soğan, soğansısı, yumru, rizom ve tohumu dışında, dikim amaçlı otsu türlerin bitkileri ile <i>Ficus L.</i> ve <i>Hibiscus L.</i> bitkileri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, <i>Bemisia tabaci</i>'den ari olarak oluşturulan bir alan menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e göre menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, <i>Bemisia tabaci</i>'den ari olarak oluşturulan ve ihracattan önceki dokuz hafta süresince, en az üç haftada bir yapılan resmî kontrollerde <i>Bemisia tabaci</i>'den ari olarak ilan edilen bir üretim yeri menşeli olduğu,</p>

			<p>veya</p> <p>c) Üretim yerinde <i>Bemisia tabaci</i>'nin bulunduğu durumlarda, bu alanda üretilen veya bekletilen bitkilerin, <i>Bemisia tabaci</i>'den arılığı sağlamak için uygun bir muameleye tabi tutulduğu ve <i>Bemisia tabaci</i>'den arındırmayı amaçlayan bu uygulamanın sonucu olarak hem ihracattan önceki dokuz hafta süresince haftalık olarak yapılan resmî kontroller, hem de bu süre zarfındaki gözlemlerde, bu üretim yerinin <i>Bemisia tabaci</i>'den ari bulunduğu ve yapılan uygulamanın detayları,</p> <p>veya</p> <p>ç) <i>Bemisia tabaci</i>'den ari, bitki materyalinden (yapay ortamda) üretildiği; <i>Bemisia tabaci</i> ile olası bulaşmayı önlemek için, steril laboratuvar ortamında yetiştirildiği ve steril koşullar altında, bu tekniklere uygun kaplarda sevk edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
--	--	--	---

17.	Yetiştirme ortamı olarak kullanılacak paketlenmiş torf ve benzeri ürünler	Tüm ülkeler	a) Tamamen Sphagnum yosunundan elde edilen torfların; –Tarım dışı alanlardan elde edilmiş ve daha önce kullanılmamış olduğu, ve –Laboratuvar analizleri sonucunda zararlı organizmalardan arı olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. b) Ekim veya dikimde kullanılacak olan diğer torf ve yetiştirme ortamları; Toprak içermemeli, ve –Bu ortamın zararlı organizmalardan arındırılması için, fümigasyon veya ısıtma işlemi tabii tutulmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
18.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları hariç kök ve yumrulu sebzeleri	Tüm ülkeler	Ürünlerin üzerinde net ağırlığının %1'den fazla toprak ve yetiştirme ortamı içermediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
19.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları hariç dikim amaçlı soğanı, soğanlar, rizomlar ve yumruları	Tüm ülkeler	Ürünlerin üzerinde net ağırlığının %1'den fazla toprak ve yetiştirme ortamı içermediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
20.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	Ürünlerin üzerinde net ağırlığının %1'den fazla toprak ve yetiştirme ortamı içermediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
21.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	Yumruların; a) <i>Tecia solanivora</i> 'nın varlığı bilinmeyen ülke menşeli olduğu, veya b) Yumruların, ilgili ISPM'e göre Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, <i>Tecia</i>

			<i>solanivora</i> 'dan ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
22.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	Yumruların; a) <i>Clavibacter sepedonicus</i> 'un varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya b) <i>Clavibacter sepedonicus</i> ile ilgili mevzuata göre veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş ülke menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
23.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	<i>Synchytrium endobioticum</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	Yumruların; a) Resmî denetimlerde <i>Synchytrium endobioticum</i> 'un tüm ırklarından ari olduğu belirlenen, kayıt altına alınan, vejetasyon periyodu boyunca denetlenen alan menşeli olduğu ve uygun bir dönem başlangıcından itibaren, üretim yeri veya onun yakın çevresinde, <i>Synchytrium endobioticum</i> 'un hiçbir belirtisinin gözlenmediği, veya b) <i>Synchytrium endobioticum</i> yönünden resmî bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmadan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
24.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Potato spindle tuber viroid'in varlığı bilinen ülkeler menşeli	Üretim yerinde son vejetasyon periyodu boyunca Potato spindle tuber viroid'den kaynaklanan hiçbir belirtinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
25.	<i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	<i>Dickeya solani</i> 'in varlığı bilinen ülkeler menşeli	Yumruların;

			<p>a) <i>Dickeya solani</i>'nin varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya</p> <p>b) <i>Dickeya solani</i>'nin varlığı bilinen ülkeler menşeli yumruların, önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği ve <i>Dickeya solani</i>'den ari olduğu tespit edilen alanda üretildiği, ve</p> <p>c) Kabul edilebilir metodlara göre resmî karantina analizlerine tabi tutularak <i>Dickeya solani</i>'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
26.	Dikim amaçlı <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	<p><i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in varlığının bilindiği ülkeler</p>	<p>Yumruların;</p> <p>a) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu, veya</p> <p>b) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in varlığı bilinen alanlarda;</p> <p>i) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'den ari olarak oluşturulmuş bir alandan elde edildiği ve alanın adı, ve</p>

			<p>ii) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in yok edilmesi için uygun yöntemin bu üretim yerinde uygulandığı ve yok edildiği, ve</p> <p>iii) Kabul edilebilir metotlara göre resmî karantina testlerine tabi tutularak <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
27.	Dikim amaçlı <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	<p>Yumruların;</p> <p>a) Önceden seleksiyona tabi tutulmuş, kabul edilebilir şartlarda muhafaza edilmiş direkt materyalden elde edildiği, ve</p> <p>b) Kabul edilebilir metotlara göre resmî karantina testlerine tabi tutularak <i>Synchytrium endobioticum</i> ve <i>Boeremia foveata</i>'dan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
28.	Dikim amaçlı olanlar hariç, <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	<p>Yumruların;</p> <p>a) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya</p> <p>b) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp.</p>

			<p><i>indonesiensis</i>'in varlığı bilinmeyen alan menşeli olduğu, veya c) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in varlığı bilinen alanlarda; i) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'den ari olarak oluşturulmuş bir alandan elde edildiği ve alanın adı, ve ii) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in yok edilmesi için uygun yöntemin bu üretim yerinde uygulandığı ve yok edildiği, ve iii) Kabul edilebilir metotlara göre resmî karantina testlerine tabi tutularak <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
29.	Dikim amaçlı <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	<p>Yumruların; <i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Globodera pallida</i>, <i>Ditylenchus dipsaci</i> ve <i>Ditylenchus destructor</i>'den ari olduğu bilinen üretim yeri menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

30.	Dikim amaçlı <i>Solanum tuberosum</i> L. yumruları	Tüm ülkeler	<p>Yumruların;</p> <p>a) <i>Meloidogyne</i> spp.'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Meloidogyne</i> spp.'den ari olarak oluşturulmuş bir alandan elde edildiği ve alanın adı,</p> <p>veya</p> <p>c) Yumruların menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ari olarak kurulan bir üretim yerinde üretildiği, konukçu bitkilerde dahil yıllık bir ankete dayalı olarak üretim yerinde yetiştirilen patates bitkileri ile birlikte uygun zamanlarda üretim yerinde ve hasattan sonra yumru köklerin dışarıdan kesilerek <i>Meloidogyne</i> spp. yönüyle görsel muayeneye tabi tutulduğu,</p> <p>veya</p> <p>(ç) Hasattan sonra yumru köklerden rastgele numune alındığı ve semptomları ortaya çıkarmak için uygun bir yöntemle semptomların varlığının kontrol edildiği veya laboratuvarında test edildiği ve uygun zamanlarda ve her durumda hem dışarıdan hem de yumru kökleri kesilerek görsel olarak incelendiği, ambalajlama zamanına kadar <i>Meloidogyne</i> spp.'nin herhangi bir semptomunun görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
31.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Musa</i> , <i>Nicotiana</i> L., <i>Pelargonium</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ve <i>Solanum melongena</i> L. bitkileri	<i>Ralstonia solanacearum</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> , <i>Ralstoniasyzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler menşeli	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp.</p>

			<p><i>indonesiensis</i>'den ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Son vejetasyon periyodu boyunca, üretim yerindeki bitkilerde <i>Ralstonia solanacearum</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i>, <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> ve <i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i>'in hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
32.	Meyve ve tohum hariç <i>Solanum lycopersicum</i> L. ve <i>Solanum melongena</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin <i>Keiferia lycopersicella</i>'dan ari olduğu, veya b) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından bitkilerin, <i>Keiferia lycopersicella</i>'dan ari alan menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
33.	Tohumları hariç, dikim amaçlı <i>Solanum lycopersicum</i> L. bitkileri; a) <i>Bemisia tabaci</i> 'nin varlığı bilinmeyen yerlerde	Tomato yellow leaf curl virus'un varlığı bilinen menşeli ülkelerde	<p>Bitkilerin; a) Tomato yellow leaf curl virus'un hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
	b) <i>Bemisia tabaci</i> 'nin varlığı bilinen yerlerde		<p>b) Üretim yerlerinde Tomato yellow leaf curl virus'un hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerlerinin <i>Bemisia tabaci</i>'den ari hale getirmek için uygun bir muameleye ve izleme sistemine tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
34.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Solanum lycopersicum</i> L. bitkileri ve <i>Solanum</i> spp. melezleri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) Tomato brown rugose fruit virus'e dayanıklı olduğu bilinen tohumlardan elde edildiği, veya</p>

			<p>b) Tomato brown rugose fruit virus için Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) Metodu ile analize tabi tutularak bu etmeden ari olduğu belirlenen tohumlardan üretildikleri ve dikim amaçlı bitkilerin yapılan analizler sonucunda Tomato brown rugose fruit virus'den ari bulunduğu,</p> <p>ve</p> <p>c) Dikim amaçlı bitkilerin, menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıt altına alınan, denetlenen, Tomato brown rugose fruit virus'u tespit için uygun zamanda gerçekleştirilen resmî denetimlerde Tomato brown rugose fruit virus'den ari olduğu bilinen üretim yerinde üretilmiş olduğu; belirtiler durumunda Tomato brown rugose fruit virus için analiz yapıldığı ve ari olduğunun anlaşıldığı,</p> <p>ve</p> <p>ç) Bitkilerin üretildiği kayıtlı üretim yerinin adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
35.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Capsicum annum</i> L. bitkileri;	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Tomato brown rugose fruit virus'e karşı dayanıklı olduğu bilinen çeşitlere ait olduğu,</p> <p>b) Bitkilerin, Tomato brown rugose fruit virus için Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) Metodu ile analize tabi tutularak bu etmeden ari olduğu belirlenen tohumlardan üretildikleri ve dikim amaçlı bitkilerin yapılan analizler sonucunda Tomato brown rugose fruit virus'den ari bulunduğu,</p> <p>ve</p> <p>c) Dikim amaçlı bitkilerin, menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıt altına alınan, denetlenen, Tomato brown rugose fruit virus'u tespit için uygun zamanda gerçekleştirilen resmî</p>

			denetimlerde Tomato brown rugose fruit virus'den ari olduğu bilinen üretim yerinde üretilmiş olduğu; belirtiler durumunda Tomato brown rugose fruit virus için analiz yapıldığı ve ari olduğunun anlaşıldığı, ve ç) Bitkilerin üretildiği kayıtlı üretim yerinin adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
36.	Soğanlar, soğansılar, rizomlar, polenler, tohumlar, yumrular ve doku kültüründeki bitkiler hariç <i>Cucurbitaceae</i> ve <i>Solanaceae</i> ekim amaçlı bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Ceratothripoides claratris</i> 'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Ceratothripoides claratris</i> 'den ari olarak oluşturulmuş bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya c) Bitkiler üretim yerinde hayatları boyunca <i>Ceratothripoides claratris</i> 'e karşı fiziksel koruma altında yetiştirildiği, bitkiler ihracat öncesinde en az üç ay süreyle en az bir defa <i>Ceratothripoides claratris</i> 'in varlığını tespit için kontrol edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
37.	Soğanlar, soğansılar, doku kültüründeki bitkiler, rizomlar, polen, tohumlar ve yumrular hariç dikim amaçlı <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thumb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativus</i> L., <i>Cucurbita</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merr., <i>Gossypium</i> , <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> , <i>Ricinus communis</i> L. ve <i>Tagetes</i> L. bitkileri	Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri	Bitkilerin; a) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Prodiplosis longifila</i> 'dan ari bir alanda üretildiği ve alanın adı, veya b) Bitkiler <i>Prodiplosis longifila</i> 'dan ari olarak kurulmuş fiziksel korumaya sahip bir üretim yerinde yetiştirilmiş olduğu, menşe ülkede <i>Prodiplosis longifila</i> 'nın varlığını tespit edilmesi amacıyla

			ihracattan en az iki ay önce veya iki aydan daha küçük olan bitkiler yaşamları boyunca son iki ay içinde resmî denetimlerde gerçekleştirildiği ve ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
38.	Tohum hariç, <i>Allium</i> L., <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Scilla L., <i>Crocus</i> L., <i>Galanthus</i> , <i>Hyacinthus</i> , <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> , <i>Stembelgia</i> , <i>Tulipa</i> L. dikim amaçlı soğanları veya çiçek soğanları	Tüm ülkeler	Son vejetasyon periyodu boyunca, bitkilerde <i>Ditylenchus dipsaci</i> 'nin hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
39.	<i>Capsicum</i> L., <i>Momordica</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum macrocarpon</i> L. ve <i>Solanum melongena</i> L. meyveleri, <i>Zea mays</i> L. canlı poleni, canlı bitkisi, ekim materyali tohumları ve daneleri;	Amerika ve Afrika	Tohumların ve danelerin; a) <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari ülkeler menşeli olduğu, veya b) İlgili ISPM'e göre, Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından oluşturulan <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari üretim alanı olduğu, veya c) (a) ve (b) maddelerinde belirtilen alanlar menşeli değilse; i) Belirtilen bitkiler menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıt edilen ve denetlenen üretim alanlarından üretildiği, ii) İhracattan önceki 3 ay boyunca üretim yerinde yapılan resmî kontrollerde, belirtilen bitkilerde <i>Spodoptera frugiperda</i> bulunmadığı, iii) İhracattan önce yapılan resmî kontrollerde belirtilen bitkilerin <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari olduğu, iv) Belirtilen bitkilerin üretim yerlerinin izlenebilirliğini garanti altına alan bilgilerin menşe

			ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından tutulduğu, v) Belirtilen bitkilerin üretildiği üretim yerinde, <i>Spodoptera frugiperda</i> 'nın bulaşmasına karşı alınan fiziksel koruma önlemlerinin tamamı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
40.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Solanaceae</i> bitkileri	<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'nin varlığı bilinen ülkeler	Son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki bitkilerde <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'nin sebep olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
41.	Tohumları hariç, dikim amaçlı <i>Beta vulgaris</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet curly top virus'un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
42.	Tohumları hariç, dikim amaçlı <i>Beta vulgaris</i> L. bitkileri	Beet leaf curl virus'un varlığı bilinen ülkeler	Bitkilerin; a) Üretim alanında Beet leaf curl virus'un varlığı bilinmeyen, ve b) Üretim yerinde ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu süresince Beet leaf curl virus'un neden olduğu hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
43.	Dikim amaçlı <i>Chrysanthemum</i> spp. bitkileri	Tüm ülkeler	Virolojik testlere göre en fazla üç generasyonluk stoklardan alınan materyalin <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> 'den arı olduğu veya çiçeklenme döneminde yapılan resmî incelemelerde en az %10'unun <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> 'den arı bulunan materyalden direkt olarak alındığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
44.	Dikim amaçlı <i>Chrysanthemum</i> spp. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) İhracattan önceki üç ay süresince, en azından aylık olarak resmî kontrolün yapıldığı ve bu süre zarfında,

			<p><i>Puccinia horiana</i>'nın hiçbir belirtisinin gözlenmediğinin bilindiği ve onun yakın çevresinde, ihracattan önceki üç ay süresince, <i>Puccinia horiana</i>'nın hiçbir belirtisinin görülmediği bilinen üretim yerlerinden geldiği,</p> <p>veya</p> <p>b) <i>Puccinia horiana</i>'ya karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,</p> <p>c) Köksüz çeliklerde; çelikler veya çeliklerin alındığı bitkiler, köklü çeliklerde ise; çeliklerde veya köklendirme yerinde (tohum yatağı) <i>Stagonosporopsis chrysanthemi</i>'nin hiçbir belirtisinin görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
45.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Chrysanthemum</i> L. ve <i>Solanum lycopersicum</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca, <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>'dan arı olan bir ülkede yetiştirilmiş olduğu;</p> <p>veya</p> <p>b) Bitkilerin, tüm vejetasyon periyodu boyunca, ihracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e uygun olarak <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>'dan arı olarak oluşturulan bir alanda yetiştirilmiş olduğu;</p> <p>veya</p> <p>c) Bitkilerin, tüm vejetasyon periyodu boyunca;</p> <p>i) <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>'dan arı olduğu resmî kontroller ve uygulanan testlerle doğrulanan bir üretim yerinde yetiştirildiği,</p> <p>ve</p> <p>ii) <i>Frankliniella occidentalis</i>'den arı alanda yetiştirildiği,</p>

46.	Tohum hariç <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. ve <i>Pelargonium</i> L'Héritier bitkileri	Tüm ülkeler	Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından bitkilerin <i>Spodoptera eridania</i> , <i>Spodoptera frugiperda</i> ve <i>Spodoptera litura</i> 'dan ari olduğu tespit edilen alanda yetiştirildiği, veya b) Vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki bitkilerde <i>Spodoptera eridania</i> , <i>Spodoptera frugiperda</i> ve <i>Spodoptera litura</i> 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği, veya c) Yukarıdaki zararlı organizmalardan korunmak için bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
47.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Chrysanthemum</i> spp. <i>Dianthus</i> spp. ve <i>Pelargonium</i> spp. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından bitkilerin <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> ve <i>Spodoptera littoralis</i> 'den ari olduğu tespit edilen alanda yetiştirildiği, veya b) Vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki bitkilerde <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> ve <i>Spodoptera littoralis</i> 'in hiçbir belirtisinin görülmediği, veya c) <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> ve <i>Spodoptera littoralis</i> 'den korunmak için bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu,

48.	<i>Chrysanthemum L., Dianthus L. ve Pelargonium</i> l'Hérit bitkileri	Tüm ülkeler	Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Bitkilerin; a) <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, b) ISPM 4 standardına uygun olarak, ilgili Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından belirlenen, <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari bir alandan üretildiği ve üretim alanının adı bitki sağlığı sertifikasında 'menşe yeri' başlığı altında belirtilmelidir. c) İhracattan önce bitkiler resmî bir incelemeye tabi tutulmuş, <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari bulunmuş ve aşağıdaki koşullara uygun bir üretim yerinden üretilmiş olmalıdır. i) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından üretim alanının tescilli ve denetlendiği, (ii) İhracattan önceki son üç ay içerisinde resmî denetimlerin yapılmış olduğu ve belirtilen bitkilerde <i>Spodoptera frugiperda</i> 'nın varlığına rastlanmadığı; (iii) Üretim yerinin <i>Spodoptera frugiperda</i> 'nın girişine karşı fiziksel izolasyona sahip olduğu; (iv) Üretim tesislerinin ihracattan önce bitkilerin üretim sahasına kadar izlenebilirliğini sağlayan bilgilerin sağlanmış olduğu; veya d)İhracatlarından önce bitkilerin resmî bir denetime tabi tutulduğu ve <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari bulunmuş olduğu ve aşağıdaki koşullara uygun bir üretim yerinden geldiği: i) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından üretim alanının tescilli ve denetlendiği,
-----	--	-------------	--

			<p>(ii) İhracattan önceki son üç ay içerisinde resmî denetimlerin yapılmış olduğu ve belirtilen bitkilerde <i>Spodoptera frugiperda</i>'nın varlığına rastlanmadığı;</p> <p>(iii)Belirtilen bitkilerin, <i>Spodoptera frugiperda</i>'dan ari olmasını sağlamak için etkili bir işleme tabi tutulduğu;</p> <p>(iv) Üretim tesislerinin ihracattan önce bitkilerin üretim sahasına kadar izlenebilirliğini sağlayan bilgilerin sağlanmış olduğu,</p> <p>(v) <i>Spodoptera frugiperda</i>'dan ari olduklarından emin olmak için hasat sonrası etkili bir işleme tabi tutulduğu,</p> <p>Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
49.	Dikim amaçlı <i>Pelargonium</i> L'Héritier bitkileri	<p>Tomato ringspot virus'un varlığı bilinen ülkeler menşeli;</p> <p>a) <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i>, <i>Xiphinema bricolense</i>, <i>Xiphinema californicum</i>, <i>Xiphinema neoamericanum</i>, <i>Xiphinema intermedium</i>, <i>Xiphinema rivesi</i> <i>Xiphinema tarjanense</i> ve Tomato ringspot virus'un diğer vektörlerinin varlığı bilinmeyen ülkeler</p> <p>b) <i>Xiphinema sensu stricto</i>, <i>Xiphinema bricolense</i>, <i>Xiphinema californicum</i>, <i>Xiphinema neoamericanum</i>, <i>Xiphinema intermedium</i>, <i>Xiphinema rivesi</i>, <i>Xiphinema tarjanense</i> ve Tomato ringspot virus'un diğer vektörlerinin varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Resmî olarak bitkilerin, Tomato ringspot virus'den ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,</p> <p>ve</p> <p>b) Resmî olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot virus'dan ari olduğu bulunan en fazla 4. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>Bitkilerin;</p> <p>a) Resmî olarak bitkilerin, hem toprak hem de bitkilerin Tomato ringspot virus'dan ari olduğu bilinen üretim yerlerinden direkt olarak alındığı,</p> <p>ve</p> <p>b) Resmî olarak onaylanmış bir virolojik teste göre Tomato ringspot virus'dan ari olduğu bulunan en fazla 2. generasyondan olan bir ebeveyn bitkiden alındığı,</p>

			Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
50.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Dianthus L.</i> bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Son iki yıl içinde en az bir kez resmî olarak onaylanmış bir testle, <i>Dickeya dianthicola</i> , <i>Paraburkholderia caryophylli</i> , <i>Phialophora cinerescens</i> 'den ari olduğu bulunan anaç bitkilerden, doğrudan elde edildiği, ve b) Bitkilerde bu zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
51.	<i>Chrysanthemum L.</i> , <i>Dianthus L.</i> , <i>Gypsophila L.</i> ve <i>Solidago L.</i> kesme çiçekleri ile <i>Apium graveolens L.</i> ve <i>Ocimum L.</i> yapraklı sebzeleri	Tüm ülkeler	Kesme çiçekler ve yapraklı sebzelerin; a) <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i> 'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) İhracatından hemen önce, resmî olarak kontrol edilmiş ve <i>Liriomyza sativae</i> ve <i>Nemorimyza maculosa</i> 'dan ari bulunmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
52.	Tohumları hariç, dikim materyali <i>Rosa spp.</i> bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin, üretim yerinde vejetasyon periyodu süresince; a) <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> 'nin görülmediği, veya

			b) Bu zararlı organizmalara karşı etkili bir mücadele uygulandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
53.	Orchidaceae familyasının kesme çiçekleri	<i>Thrips palmi</i> 'nin varlığı bilinmeyen ülkeler	Kesme çiçeklerin; a) <i>Thrips palmi</i> 'den ari bir ülke menşeli olduğu, veya b) İhracatından hemen önce, resmî olarak kontrol edildiği ve <i>Thrips palmi</i> 'den ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
54.	Orchidaceae familyasının kesme çiçekleri	<i>Thrips palmi</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Kesme çiçeklerin; a) İhracattan önceki üç ay boyunca en az ayda bir defa yapılan resmî denetimlerde <i>Thrips palmi</i> 'den ari bulunan bir üretim yerinde üretilmiş olduğu, veya b) <i>Thrips Palmi</i> 'den arındırmak için sağlamak için uygun bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve yapılan fümigasyon işleminin detayları, Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.
55.	Tohumu dışında dikim amaçlı, doğal veya yapay olarak bodurlaştırılmış bitkiler	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Doğal yaşamdan doğrudan toplananlar dâhil bitkilerin, resmî bir denetim sistemine tabi olan kayıtlı fidanlıklarda, sevkiyattan önce, en az iki ardışık yıl süresince yetiştirildiği, tutulduğu ve belli bir biçimde büyütüldüğü, b) (a)'da bahsedilen fidanlıklardaki bitkiler: en az (a)'da bahsedilen dönem süresince: -Yerden en az 50 cm yükseklikteki raflar üzerine yerleştirilmiş saksılara dikilmiş olduğu, -Pas hastalıklarından arılığı sağlamak için uygun muamelelere tabi tutulduğu; aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının

			<p>“Dezenfestasyon ve/veya Dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,</p> <p>-Bu Yönetmelik ve eklerinde zararlı organizmaların varlığı açısından, uygun aralıklarla, en az yılda 6 defa resmî olarak kontrol edildiği, aynı zamanda, fidanlığın yakın çevresindeki bitkiler üzerinde de yapılan bu kontroller, tarla veya fidanlıkta en azından her sıranın makroskobik kontrolü şeklinde ve 3000’den fazla bitkinin olmadığı cinslerde, verilen bir cinsten en az 300 bitkilik tesadüfî bir örnekleme yöntemiyle veya bitki sayısının 3000’den fazla olduğu cinslerde bitkilerin %10’unda, yetiştirme ortamı üzerindeki bitkinin tüm kısımlarının gözlemlendiği,</p> <p>-Bu kontrollerde, yukarıdaki paragrafta açıklanan ilgili zararlı organizmalardan ari olduğu, bulaşık bitkilerin ayıklandığı, uygun durumlarda, kalan bitkilerin, ariliğini garantilemek için, etkili bir şekilde muameleye tabi tutulduğu ve buna ek olarak, uygun bir süre bekletildiği ve gözlemlendiği,</p> <p>-Daha önce kullanılmamış bir yapay yetiştirme ortamına ya da fümigasyon veya uygun bir sıcaklık uygulaması ile muameleye tabi tutulmuş doğal bir yetiştirme ortamına dikildiği ve herhangi bir zararlı organizma içermediği,</p> <p>-Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari kalmasını sağlayan koşullarda tutulduğu ve sevkiyattan önceki iki hafta içinde:</p> <p>-Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve kökleri çıplak tutulmuş olduğu,</p> <p>veya</p>
--	--	--	--

			<p>–Asıl yetiştirme ortamını uzaklaştırmak için silkelenmiş, temiz su ile yıkanmış ve (b) 5 inci paragraf başında belirtilen şartları karşılayan yetiştirme ortamına tekrar dikilmiş olduğu, veya</p> <p>–Yetiştirme ortamının zararlı organizmalardan ari olmasını sağlamak için, uygun muamelelere tabi tutulduğu ve aktif madde, doz ve uygulama tarihi, Bitki Sağlık Sertifikasının “Dezenfeksiyon ve/veya dezenfeksiyon Uygulaması” başlığı altında belirtildiği,</p> <p>c) Resmî olarak mühürlenmiş kapalı konteynerlerde paketlenmiş halde olduğu ve kayıt altına alınmış fidanlıkların kayıt numarasını taşıdığı ve bu numaranın Bitki Sağlık Sertifikasının “Açıklama” başlığı altında yer aldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
56.	Meyve ve tohumlar dışında kozalaklı bitkiler (Pinopsidae)	Tüm ülkeler	<p>Resmî kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği ve üretim yerinin <i>Pissodes cibriani</i>, <i>Pissodes fasciatus</i>, <i>Pissodes nemorensis</i>, <i>Pissodes nitidus</i>, <i>Pissodes punctatus</i>, <i>Pissodes strobi</i>, <i>Pissodes terminalis</i>, <i>Pissodes yunnanensis</i> ve <i>Pissodes zitacuarensis</i> türlerinden ari olduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
57.	Doku kültürü bitkileri, polen ve tohumlar dışındaki dikim amaçlı <i>Alnus formosana</i> (Burkill) Makino, <i>Artocarpus chama</i> Buch.Ham., <i>A. heterophyllus</i> Lam. <i>A. integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Bombax ceiba</i> L., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>B. Papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth., <i>Camellia oleifera</i> Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl, <i>Cunninghamia</i>	Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Rusya (yalnızca	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Gövde tabanından itibaren çapın 1 cm'den küçük olduğu, veya</p> <p>b) <i>Apriona germari</i>'den ari bir ülke menşeli olduğu, veya</p> <p>c) Menşeye ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre oluşturulan</p>

	<p><i>lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i>, <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>F. virens</i> Aiton, <i>F. infectoria</i> Willd., <i>F. Retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carr., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott, <i>Trema orientale</i> (L.) von Blume, <i>Trema tomentosum</i> (Roxb.) H. Hara, <i>Triadica sebifera</i> (L.) Roxb Small, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ve <i>Xylosma</i> G. Forst. bitkileri</p>	<p>aşağıdaki kısımlar: Uzak Doğu Federal Bölgesi (Dalnevostochny federalny okrug), Sibirya Federal Bölgesi (Sibirsky federalny okrug) ve Ural Federal Bölgesi (Uralsky federalny okrug), Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye, Tacikistan, Tayland, Doğu Timor, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Vietnam ve Yemen</p>	<p>bir alanda, <i>Apriona germari</i>'den ari olarak üretildiği ve alanın adı, veya ç) Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından İlgili ISPM'e göre oluşturulan bir üretim yerinde Bitkiler yaşamları boyunca veya ihracattan en az iki yıllık bir süre önce, <i>Apriona germari</i>'den ari olarak üretildiği, ve i) Bitkilerde <i>Apriona germari</i> 'nin yılda iki kez uygun zamanlarda resmî denetime tabi tutulduğu ve hiçbir zararlı belirtisine rastlanmadığı, ve ii) Genişliği en az 2000 m olan bir tampon bölge ile çevrili bir üretim yerinde zararlıya karşı uygun önleyici tedbirlerin uygulandığı ve <i>Apriona germari</i>'nin bulunmadığının her yıl uygun zamanda yapılan resmî kontrollerde teyit edildiği, ve iii) İhracattan hemen önce, bitkilerin gövdelerinde <i>Apriona germari</i> 'nin varlığının tespiti için kontrole tabi tutulduğu gerektiğinde bu kontrollerin tahrifatlı örnekleme içerdiği, veya, d) Bitkiler yaşamları boyunca <i>Apriona germari</i> 'nin girişine karşı fiziksel izolasyonu olan bir üretim yerinde ihracattan önce en az iki yıllık bir süre boyunca yetiştirilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
58.	<p>Doku kültürü bitkileri, polen ve tohumlar dışındaki dikim amaçlı <i>Debregeasia saeneb</i> (Forsskål) Hepper & Wood., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.)</p>	<p>Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak,</p>	<p>Bitkilerin; a) Gövde tabanından itibaren çapın 1 cm'den küçük olduğu,</p>

C.K.Schneid., <i>Morus L.</i> , <i>Populus L.</i> ve <i>Salix L.</i> , bitkileri	Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Rusya (yalnızca aşağıdaki kısımlar: Uzak Doğu Federal Bölgesi (Dalnevostochny federalny okrug), Sibiry Federal Bölge (Sibirsky federalny okrug) ve Ural Federal Bölgesi (Uralsky federalny okrug)), Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye, Tacikistan, Tayland, Doğu Timor, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Vietnam ve Yemen	veya b) <i>Apriona cinerea</i> 'dan ari bir ülke menşeli olduğu, veya c) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan bir alanda, <i>Apriona cinerea</i> 'den ari olarak üretildiği ve alanın adı, veya ç) Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre oluşturulan bir üretim yerinde bitkilerin yaşamları boyunca veya ihracattan en az iki yıllık bir süre önce <i>Apriona cinerea</i> 'den ari olarak üretildiği, ve i) <i>Apriona cinerea</i> belirtisi için yılda iki kez resmî denetime tabi tutulmuş, uygun zamanlarda yapılmış ve hiçbir zararlı belirtisine rastlanmamış, ve ii) Genişliği en az 2000 m olan bir tampon bölge ile çevrili bir üretim yerinde uygun önleyici önlemlerin uygulandığı ve <i>Apriona cinerea</i> 'nin bulunmadığının her yıl uygun zamanlarda yapılan resmî kontrollerde teyit edildiği, ve ii) İhracattan hemen önce, bitkilerin gövdelerinde <i>Apriona cinerea</i> 'nin varlığı tespiti için kontrole tabi tutulduğu, gerektiğinde bu kontrollerin tahribatlı örneklemeyi içerdiği, veya, d) Bitkiler yaşamları boyunca veya <i>Apriona cinerea</i> girişine karşı fiziksel izolasyonu olan bir üretim yerinde ihracattan önce en az iki yıllık bir süre boyunca yetiştirilmiş olduğu,
--	---	--

			<p>ve</p> <p>İhracattan hemen önce, bitkilerin gövdelerinde <i>Apriona cinerea</i>'nin varlığını tespiti için kontrole tabi tutulduğu gerektiğinde bu kontrollerin tahribatlı örnekleme içerdiği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
59.	<p>Doku kültürü, bitkileri polen ve tohumları dışındaki dikim amaçlı <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold ve Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kunt., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> von Bunge, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl, <i>Cornus kousa</i> (Miq.) Hance, <i>Crataegus phaenopyrum</i> (C.L.) Medik., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneid., <i>Eribotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam., <i>Oreocnide frutescens</i> Miq., <i>Platanus x hispanica</i> Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.), <i>Pseudocystidia sinensis</i> (Dumont de Courset) Schneid., <i>Pytherocarpa rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>P. stenoptera</i> C. de Candolle., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. ve <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino bitkileri.</p>	<p>Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Butan, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lübnan, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Kuzey Kore, Umman, Pakistan, Filipinler, Katar, Rusya (yalnızca aşağıdaki kısımlar: Uzak Doğu Federal Bölgesi (Dalnevostochny federalny okrug), Sibirya Federal Bölge (Sibirsky federalny okrug) ve Ural Federal Bölgesi (Uralsky federalny okrug)), Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye, Tacikistan, Tayland, Doğu Timor, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Vietnam ve Yemen</p>	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Gövde tabanından itibaren çapın 1 cm'den küçük olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) <i>Apriona rugicollis</i>'den ari bir ülke menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan bir alanda, <i>Apriona rugicollis</i>'den ari olarak üretildiği ve alanın adı,</p> <p>veya</p> <p>ç) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından bitkiler yaşamları boyunca veya ihracattan en az iki yıllık bir süre önce, ilgili ISPM'e göre oluşturulan bir üretim yerinde <i>Apriona rugicollis</i>'den ari olarak üretildiği,</p> <p>ve</p> <p>i) <i>Apriona rugicollis</i> belirtisi varlığı için yılda iki kez resmî uygun zamanlarda denetime tabi tutulduğu ve hiçbir zararlı belirtisine rastlanmadığı,</p> <p>ii) Genişliği en az 2000 m olan bir tampon bölge ile çevrili bir üretim yerinde uygun önleyici önlemlerin uygulandığı ve <i>Apriona rugicollis</i>'in bulunmadığının her yıl uygun zamanlarda yapılan resmî kontrollerde teyit edildiği,</p> <p>ve</p>

			<p>iii) İhracattan hemen önce, bitkilerin gövdelerinde <i>Apriona rugicollis</i>'in varlığının tespiti için kontrole tabi tutulduğu, gerektiğinde bu kontrollerin tahribatlı örnekleme yapıldığı,</p> <p>veya,</p> <p>d) Bitkiler <i>Apriona rugicollis</i> girişine karşı fiziksel izolasyonu olan bir üretim yerinde yaşamları boyunca veya ihracattan önce en az iki yıllık bir süre boyunca yetiştirilmiş olduğu,</p> <p>ve</p> <p>İhracattan hemen önce, özellikle bitkinin gövdelerinde <i>Apriona rugicollis</i> olup olmadığının tespiti için kontrole tabi tutulduğu; gerektiğinde, bu kontroller tahribatlı örnekleme yapıldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
60.	<p>Doku kültüründeki bitkileri, meyve, polen ve tohumları dışındaki dikim amaçlı <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) C.A. Paris, <i>Adiantum jordanii</i> Müll. von Halle, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i>, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) A. Gray, <i>Frangula purshiana</i> Coop., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> Raoul, <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindl.) Römer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carr., <i>Larix x eurolepis</i> Henry, <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i>, <i>Lonicera hispidula</i> Torr. & A.Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Magnolia doltsopa</i> (de Candolle) Figlar, <i>Nothofagus</i></p>	<p>Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam</p>	<p>Bitkiler;</p> <p>a) <i>Phytophthora ramorum</i>'dan ari alanlar menşeli olmalı ve alanın adı,</p> <p>b) Son vejetasyon periyodu başlangıcından itibaren gerçekleştirilen resmî kontrollerde bitkilerde herhangi bir şüpheli semptom olması halinde laboratuvar testleri de dahil olmak üzere, yapılan resmî kontrollerde üretim yerindeki hassas bitkilerde <i>Phytophthora ramorum</i>'un hiçbir belirtisinin gözlemlenmediği,</p> <p>ve</p> <p>Sevkiyattan önce bitkilerin alınan numunelerin incelendiği ve bu incelemelerde <i>Phytophthora ramorum</i>'dan ari bulunduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

	<p><i>obliqua</i> (Mirb.) Orsted, <i>Notholithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arnott) Manos et al, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) Green, <i>Parrotia persica</i> (de Candolle) von Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L., <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> Hook., <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. ve <i>Viburnum</i> L. bitkileri</p>		
61.	<p>Doku kültüründeki bitkileri, polen, aşı kalemleri, çelikler ve tohumları hariç dikimi amaçlı <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i>, <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L. ve <i>Ulmus</i> L. bitkileri</p>	<p>Afganistan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan</p>	<p>Bitkilerin; a) Gövde tabanından itibaren çapın 1 cm'den küçük olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre bitkiler yaşamları boyunca, oluşturulan <i>Trirachys sartus</i>'dan ari bir alanda üretildiği ve alanın adı, veya c) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre bitkiler yaşamları boyunca veya ihracattan en az iki yıllık bir süre önce, oluşturulan bir üretim yerinde <i>Trirachys sartus</i>'dan ari olarak üretildiği, veya ç) Üretim yerinde <i>Trirachys sartus</i> zararlıının varlığını tespiti için yılın uygun zamanlarda yılda en az bir defa gerçekleştirilen kontrole tabi tutulduğu, veya i) <i>Trirachys sartus</i>'a karşı fiziksel izolasyonu sağlanan üretim yerinde varlığından veya herhangi bir</p>

			<p>belirtisinden şüphe duyulması halinde yılın uygun zamanlarında zararlının varlığını tespit etmek için yılda en az bir kontrole tabi tutulduğu,</p> <p>(ii) Genişliği en az 500 m olan bir tampon bölge ile çevrili üretim yerinde uygun önleyici tedbirlerin uygulandığı ve <i>Trirachys sartus</i>'un bulunmadığının her yıl uygun zamanlarda yapılan resmî araştırmalarla teyit edildiği,</p> <p>ve</p> <p>İhracattan önce bitkiler özellikle bitki sapları, <i>Trirachys sartus</i> varlığı için tahrir edici örnekleme ve dahil olmak üzere kontrole tabi tutulduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
62.	Doku kültürü, polen ve tohumları dışında dikimi amaçlı <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> 'nun konukçu olan bitkiler	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Gövde tabanında itibaren 2 cm'den daha az bir çapa sahip olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) Menşee ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan bir alanda, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>'dan ari olduğu tespit edilen alanda üretildiği ve alanın adı,</p> <p>veya</p> <p>ç) Üretim yeri:</p> <p>(i) <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>'nun bulaşmasına karşı ihracattan en az altı ay önce, uygun zamanlarda resmî denetimlere tabi tutulduğu ve zararlıdan ari olduğunun tespit edildiği, en az aşağıdaki tuzaklarla teyit edilen bir üretim sahasında, ihracattan hemen</p>

			<p>önce de dahil olmak üzere en az dört haftada bir kontrol edildiği, veya (ii) Üretim yerinde son vejetasyon periyodu başından itibaren, en az dört haftada bir gerçekleştirilen; resmî kontroller sırasında ari bulunmuştur. Üretim yerinde zararlının varlığından şüphelenilmesi durumunda zararlıya karşı uygun mücadele yapılmış, zararlının bulunduğu alanın uygun zamanlarda izlenip görülmesi halinde <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> için 1 km'lik bir çevre zonu içerisindeki bitkilerin derhal imha edildiği, ve İhracattan hemen önce, bitkilerin sevkiyatlarında, özellikle bitkilerin gövde ve dallarında zararlının varlığı için resmî bir muayeneye tabi tutulduğu. Muayene için zararlı varlığı için yapılacak numune alımı da dahil numunenin boyutu, en az %99'luk bir güven seviyesi ile en az %1 bulaşıklık seviyesinin tespitini mümkün kılacak şekilde olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
63.	Doku kültürü bitkiler, polen ve tohumlar hariç dikim amaçlı <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ve <i>Quercus</i> L. bitkileri	Çin, Kuzey Kore, Rusya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam	Bitkilerin; a) Gövde tabanında itibaren 2 cm'den daha az bir çapa sahip olduğu, b) Menşee ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Neocerambyx raddei</i> 'den ari bir alanda üretildiği ve alanın adı, c) Bitkilerin yaşamları boyunca veya en az iki yıllık bir süre boyunca, ISPM'e göre <i>Neocerambyx raddei</i> içermeyen bir üretim yerinde yetiştirildiği,

			<p>i) <i>Neocerambyx raddei</i>'nin varlığını tespit etmek için yılın uygun zamanlarında her yıl en az bir defa denetime tabi tutulan ve <i>Neocerambyx raddei</i>'nin girişine karşı fiziksel izolasyonlu bir üretim sahasında üretildiği,</p> <p>ii) Genişliği en az 2000 m olan etrafı çevrili bir tampon bölgede Resmî kontrollerde <i>Neocerambyx raddei</i>'nin bulunmadığının doğrulandığı ve ilgili zararlının varlığını tespit etmek uygun koruyucu önlemlerin uygulandığı bir üretim sahasında yılın uygun zamanlarında <i>Neocerambyx raddei</i> belirtisinin tespiti için yılda en az iki kontrole tabi tutulduğu, ve</p> <p>Bitkiler ihracattan önce <i>Neocerambyx raddei</i>'nin varlığını tespit etmek için özellikle bitki sapları da dahil olmak üzere, tahrip edici örneklemenin yapıldığı kontrole tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
64.	Meyve ve tohumlar hariç dikim amaçlı <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailanthifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. ve <i>Ulmus davidiana</i> Planch bitkileri	Beyaz Rusya, Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kuzey Kore, Rusya, Güney Kore, Tayvan, Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri	Bitkilerin, menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından <i>Agrilus planipennis</i> 'den ari olarak, ilgili ISPM'e göre kurulmuş ve belirtilen zararlının varlığının resmî olarak teyit edildiği en yakın bilinen alandan en az 100 km uzaklıkta bulunan bir alanda üretildiği ve alanın adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
65.	Meyve ve tohum dışındaki kozalaklı bitkiler, boyu 3 m'den fazla	Tüm ülkeler	Resmî kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği ve üretim yerinin Scolytinae alt familyasının, bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan türlerinden ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
66.	Tohumu dışında, <i>Pinus</i> L. dikim amaçlı bitkileri	Tüm ülkeler	Son vejetasyon periyodunun başlangıcından itibaren, üretim yerinde veya yakın çevresinde, <i>Lecanosticta</i>

			<i>acicola</i> ve <i>Dothistroma septosporum</i> 'un hiçbir belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
67.	Çoğaltım amaçlı tohum ve kozalak dâhil dikim amaçlı <i>Pinus</i> spp. ve <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco bitkileri	Tüm ülkeler	Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıtlı ve denetimli üretim yerlerinde yetiştirilmiş olmalı, ve a) <i>Fusarium circinatum</i> 'dan ari olduğu bilinen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Tüm vejetasyon periyodu boyunca orijin ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e uygun olarak belirlenen ve Bitki Sağlık Sertifikasının "menşe yeri" kısmında ismi belirtilen, <i>Fusarium circinatum</i> 'dan ari olduğu tespit edilen alanda yetişmiş olduğu, veya c) İhracattan önce iki yıllık bir dönem boyunca üretim yerinde yapılan resmî denetimlerde <i>Fusarium circinatum</i> 'un hiçbir belirtisinin görülmediği ve ihracatın hemen öncesinde teste tabi tutulmuş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
68.	Tohumu dışında <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> Mill., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. ve <i>Tsuga</i> Carr. dikim amaçlı bitkileri	Tüm ülkeler	Resmî kontrol altında olan fidanlıklarda üretildiği, son vejetasyon periyodunun başlangıcından itibaren tamamında, üretim yerinde veya yakın çevresinde, <i>Melampsora medusae</i> 'nin hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
69.	Tohum ve meyve hariç, dikim amaçlı <i>Castanea</i> Mill. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Dryocosmus kuriphilus</i> 'dan ari olduğu bilinen ülke menşeli olduğu, veya

			b) Tüm vejetasyon dönemi boyunca orijin ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e uygun olarak belirlenen ve Bitki Sağlık Sertifikasının "menşe yeri" kısmında ismi belirtilen <i>Dryocosmus kuriphilus</i> 'dan ari olduğu tespit edilen alanda yetişmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
70.	Tohum ve meyve hariç, <i>Castanea</i> Mill. ve <i>Quercus</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	Son vejetasyon periyodu boyunca, üretim yerinde veya yakın çevresinde, <i>Cronartium</i> spp.'nin hiçbir belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
71.	Tohum ve meyve hariç, <i>Quercus</i> L. bitkileri	ABD menşeli	Bitkilerin <i>Bretziella fagacearum</i> 'dan ari olduğu bilinen alan menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
72.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Castanea</i> Mill. ve <i>Quercus</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Cryphonectria parasitica</i> 'dan ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Son vejetasyon periyodu boyunca, üretim yeri veya yakın çevresinde, <i>Cryphonectria parasitica</i> 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
73.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Corylus</i> bitkileri	Kanada ve ABD menşeli	Bitkilerin; a) <i>Anisogramma anomala</i> 'dan ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Son üç vejetasyon periyodu süresince yürütülen resmî kontrollerde, üretim yeri veya yakın çevresinin, <i>Anisogramma anomala</i> 'dan ari olarak belirlendiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
74.	Tohum ve doku kültüründeki bitkileri dışındaki dikim amaçlı <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailanthifolia</i>	Kanada, Çin, Japonya, Moğolistan, Kore Cumhuriyeti, Rusya, Tayvan,	Bitkilerin orijin ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM şartlarına

	Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. bitkileri	Demokratik Kore Cumhuriyeti ve ABD menşeli	uygun olarak kurulan <i>Agrilus planipennis</i> 'den ari alan menşeli olduğu belirlenmiş bir alanda yetiştirildiği ve kurulan bu alanın yeri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
75.	Tohum hariç <i>Juglans</i> L. ve <i>Pterocarya</i> Kunth dikim amaçlı bitkileri	ABD menşeli	Bitkilerin; a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca orijin ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan, <i>Geosmithia morbida</i> ve <i>Pityophthorus juglandis</i> den ari bir alanda yetiştirildiği, veya b) İhracattan önceki iki yıl boyunca gerçekleştirilen resmî kontrollerle, üretim yeri ve üretim yerini çevreleyen en az 5 km yarıçapındaki alanda <i>Geosmithia morbida</i> 'nın belirtileri ve vektörü <i>Pityophthorus juglandis</i> 'in varlığının gözlenmemiş olduğu; bitkilerin ihracattan hemen önce denetlenmiş olduğu ve üretim yerinden sonra bulaşmayı önleyecek şekilde taşınmış ve paketlenmiş olduğu, veya c) Tam bir fiziksel izolasyonu olan bir üretim yerinde üretilmiş ve üretim tesislerinin ihracattan hemen önce denetlenmiş ve üretim yerinden çıktıktan sonra bulaşmayı önleyecek şekilde taşınmış ve paketlenmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
76.	Meyve ve tohumları hariç, yapraklı veya yapraksız kesilmiş dalları dahil <i>Betula</i> L. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkinin menşe ülkesinin <i>Agrilus anxius</i> 'dan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
77.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Platanus</i> L. bitkileri	Arnavutluk, Ermenistan, İsviçre ABD menşeli	Bitkilerin; a) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre kurulan

			<p><i>Ceratocystis platani</i>'den ari olduğu bilinen bir alanda yetiştirildiği ve kurulan bu alanın yeri, veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e göre kurulan <i>Ceratocystis platani</i>'den ari bir üretim yerinde yetiştirildiği;</p> <p>(i) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kaydedildiği ve denetlendiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) <i>Ceratocystis platani</i>'nin herhangi bir belirtisini ve varlığını tespit etmek için yılın en uygun zamanlarında yıllık olarak resmî incelemelere tabi tutulduğu,</p> <p>ve</p> <p>(iii) Temsili bir numunesinin, <i>Ceratocystis platani</i>'nin varlığı için yılın uygun zamanlarında teste tabi tutulduğu ve görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
78.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Populus L.</i> bitkileri	Tüm ülkeler	<p>Son vejetasyon periyodu boyunca <i>Melampsora medusae</i>'nin hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
79.	Tohum ve meyve hariç, <i>Populus L.</i> bitkileri	ABD menşeli	<p>Son vejetasyon periyodu boyunca <i>Sphaerulina musiva</i>'nin hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
80.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Ulmus L.</i> bitkileri	Kuzey Amerika ülkeleri menşeli	<p>Son vejetasyon periyodu boyunca <i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>'nin hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
81.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Acer spp., Aesculus hippocastanum L., Alnus spp., Betula spp., Carpinus</i>	<i>Anoplophora chinensis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler	Bitkilerin:

<p>spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Lagerstroemia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Salix</i> spp. ve <i>Ulmus</i> spp. bitkileri</p>		<p>a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca, kayıt altına alınan, orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlenen ve bu Organizasyon tarafından ilgili ISPM'e (ISPM No: 4) uygun olarak belirlenmiş zararlıdan ari olduğu tespit edilen alanda bulunan bir üretim yerinde yetiştirilmiş olduğu ve bu alanın adı Bitki Sağlık Sertifikasının "menşe yeri" başlığı altında belirtilmelidir, veya</p> <p>b) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem boyunca uluslararası standartlara (ISPM No: 10) uygun olarak <i>Anoplophora chinensis</i>'den ari üretim yerinde yetiştirildiği ve bu üretim yerinin:</p> <p>(i) Kayıt altına alındığı ve orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlendiği, ve</p> <p>(ii) Yılın uygun zamanlarında, en az iki resmî denetime tabi tutulduğu ve <i>Anoplophora chinensis</i>'in hiçbir belirtisinin bulunmadığı, ve</p> <p>(iii) Bitkilerin yetiştirildiği alanın konum itibarıyla <i>Anoplophora chinensis</i>'in bulaşmasına karşı tamamıyla fiziksel bir koruma altında olduğu veya önleyici uygun tedbirler uygulanarak, yılın uygun zamanlarında <i>Anoplophora chinensis</i>'in varlığını veya belirtisini tespit etmek için resmî sürveylerin yapıldığı, en az 2 km çapında bir tampon bölge ile çevrelenmiş olduğu, <i>Anoplophora chinensis</i>'in belirtisinin görülmesi durumunda tampon bölgenin zararlıdan ari hale getirilmesi için acilen eradikasyon tedbirlerinin alındığı,</p> <p>ve</p>
--	--	---

			(iv) Bitkilerin ihracatının hemen öncesinde, özellikle dal ve köklerinde <i>Anoplophora chinensis</i> 'in varlığının tespiti için çok dikkatli bir incelemeye tabi tutulduğu, bu incelemenin tahripkar bir örnekleme kapsadığı, inspeksiyon için numune miktarının en azından %1 oranında bulaşıklığı %99 güvenilirlik oranıyla tespit edebilecek kadar olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
82.	Meyve ve tohumları hariç <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Albizia</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Buddleja</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Celtis</i> spp., <i>Cercidiphyllum</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Elaeagnus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Koelreuteria</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Melia</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Robinia</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sophora</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Tilia</i> spp. ve <i>Ulmus</i> spp. bitkileri	<i>Anoplophora glabripennis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler menşeli;	Bitkilerin: a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca, kayıt altına alınan, orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlenen ve bu Organizasyon tarafından ilgili ISPM'e uygun olarak belirlenmiş zararlıdan arı alanda bulunan arı üretim yerinde yetiştirilmiş olduğu ve bu alanın adı Bitki Sağlık Sertifikasının "menşe yeri" başlığı altında belirtilmelidir, veya b) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem boyunca uluslararası standartlara (ISPM No: 10) uygun olarak <i>Anoplophora glabripennis</i> 'den arı üretim yerinde yetiştirildiği ve bu üretim yerinin: (i) Kayıt altına alındığı ve orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlendiği, ve (ii) Yılın uygun zamanlarında, en az iki resmî denetime tabi tutulduğu ve <i>Anoplophora glabripennis</i> 'in hiçbir belirtisinin bulunmadığı, ve (iii) Bitkilerin yetiştirildiği alanın konum itibarıyla <i>Anoplophora glabripennis</i> 'in bulaşmasına karşı tamamen fiziksel bir koruma altında olduğu veya

			<p>önleyici uygun tedbirler uygulanarak, yılın uygun zamanlarında <i>Anoplophora glabripennis</i>'in varlığını veya belirtsini tespit etmek için resmî sürveylerin yapıldığı, en az 2 km yarıçapında bir tampon bölge ile çevrelenmiş olduğu, <i>Anoplophora glabripennis</i>'in belirtsininin görülmesi durumunda tampon bölgenin zararlıdan ari hale getirilmesi için acilen eradikasyon tedbirlerinin alındığı,</p> <p>ve</p> <p>(iv) İhracatının hemen öncesinde, özellikle dal, gövde ve köklerinde <i>Anoplophora glabripennis</i>'in varlığının tespiti için çok dikkatli bir incelemeye tabi tutulduğu, bu incelemenin tahripkar bir örnekleme kapsadığı, inspeksiyon için numune miktarının en azından %1 oranında bulaşıklığı %99 güvenilirlik oranıyla tespit edebilecek kadar olduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
83.	Tohum, polen, in vitro, kalem ve çelikleri hariç dikim amaçlı <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik. <i>Crataegus</i> L. <i>Cydonia</i> ., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> , <i>Pyrus</i> ve <i>Sorbus</i> L. bitkileri	<i>Saperda candida</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler menşeli	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca <i>Saperda candida</i>'dan ari alanda yetiştirilmiş olduğu ve bu alanın yeri,</p> <p>veya</p> <p>(b) İhracattan önce en az iki yıl resmî kontrollerin yapıldığı, iki yaşından genç bitkiler içinse yaşamları boyunca <i>Saperda candida</i>'dan ari ve ilgili ISPM'e göre uygun olarak yetiştirildiği:</p> <p>(i) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlendiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) Yılda iki kez uygun zamanlarda yapılan denetimlerde <i>Saperda candida</i>'ya ait belirtilerin görülmediği,</p>

			<p>ve</p> <p>(iii) Bitkilerin, <i>Saperda candida</i>'ya karşı tam bir fiziksel koruma sağlanan yerde yetiştirildiği, veya</p> <p>-En az 500 m genişliğinde uygun koruyucu önlemlerin alındığı bir tampon bölge ile çevrelenmiş, yılın uygun zamanlarında gerçekleştirilen resmî kontrollerde <i>Saperda candida</i>'nın varlığının resmî olarak tespit edilmediği üretim yerinde üretildiği, ve</p> <p>(iv) İhracattan hemen önce, <i>Saperda candida</i>'nın varlığının tespiti için, bitkilerin özellikle gövdelerinin zarar görmüş yerlerinden çok ayrıntılı bir kontrol yapıldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
84.	Doku kültürü, tohumları ve meyveleri dışında <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> ve <i>Vaccinium</i> L. dikim amaçlı bitkileri	Kanada, Meksika ve ABD	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Tüm vejetasyon periyodu boyunca orijin ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Grapholita packardi</i> arınmış bir alanda yetiştirildiği ve bu alanın yeri, veya</p> <p>b) İhracattan önce en az iki yıl resmî kontrollerin yapıldığı, iki yaşından genç bitkiler içinse yaşamları boyunca <i>Grapholita packardi</i>'den arı ve ilgili ISPM'e göre uygun olarak yetiştirildiği:</p> <p>(i) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlendiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) Yılda iki kez uygun zamanlarda yapılan denetimlerde <i>Grapholita packardi</i>'ye ait belirtilerin görülmediği,</p> <p>ve</p>

			<p>(iii) Bitkilerin, <i>Grapholita packardi</i>'ye karşı tam bir fiziksel koruma sağlanan yerde yetiştirildiği, veya</p> <p>-En az 500 m genişliğinde uygun koruyucu önlemlerin alındığı bir tampon bölge ile çevrelenmiş, yılın uygun zamanlarında gerçekleştirilen resmî kontrollerde <i>Grapholita packardi</i>'nin varlığının resmî olarak tespit edilmediği üretim yerinde üretildiği, ve</p> <p>(iv) İhracattan hemen önce, <i>Grapholita packardi</i> varlığının tespiti için, bitkilerin özellikle gövdelerinin zarar görmüş yerlerinden çok ayrıntılı bir kontrol yapıldığı, veya</p> <p>c) Bitkilerin <i>Grapholita packardi</i>'ye karşı tam bir fiziksel koruma sağlanan yerde yetiştirildiği ve zararlıının görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
85.	<i>Xylella</i> konukçusu olan 86. ve 87. madde dışındaki dikim amaçlı bitkiler	<i>Xylella fastidiosa</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) İhracattan önce en az üç yıl veya üç yaşından küçük bitkilerde, yaşamları boyunca ISPM 4'e göre vetejetasyon dönemlerinde gerekli önlemlerin alındığı, <i>Xylella fastidiosa</i>'nın görülmediği bir ülkede yetiştirilmiş olduğu, veya</p> <p>b) İhracattan önce en az üç yıl veya üç yaşından küçük bitkilerde, yaşamları boyunca ISPM 4'e göre vetejetasyon dönemlerinde gerekli önlemlerin alındığı, <i>Xylella fastidiosa</i>'nın görülmediği bir alanda yetiştirilmiş olduğu, veya</p>

		<p>c) Menşesinde söz konusu bitkilerde <i>Xylella fastidiosa</i>'nın var olup olmadığının bilinmediği alanlar,</p> <p>(i) Bitkilerin üretildiği bu arazinin:</p> <p>(aa) Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM 10'a göre <i>Xylella fastidiosa</i> ve vektörlerinden arı olduğunun kabul edildiği,</p> <p>(bb) <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörlerinin girişine karşı fiziksel olarak korunduğu,</p> <p>(cc) 100 m genişliğinde bir tampon bölge ile çevrili alandaki tüm bitkilerin resmî olarak yılda iki kez kontrol edildiği; <i>Xylella fastidiosa</i> belirtisi gösteren veya bulaşıklığı tespit edilen arazilerde bitkilerin derhal imha edildiği ve imha işleminden önce <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörlerine karşı uygun bitki sağlığı uygulamalarının yapıldığı,</p> <p>(çç) Yıl boyunca uygun periyotlarda <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörlerinden arılığını sağlayacak, imha dahil bitki sağlığı uygulamalarının yapıldığı,</p> <p>(dd) “(cc)” maddesinde belirtilen tampon bölge de dahil, yıllık olarak en az iki uçuş sezonu boyunca resmî kontrollerde <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörlerinin kontrol edildiği,</p> <p>(ee) Üretim süresi boyunca hem <i>Xylella fastidiosa</i> belirtileri hem de vektörlerinin bulunduğu araziler ya da şüpheli belirtilerin gözlemlendiği arazilerde testlerin yapıldığı ve <i>Xylella fastidiosa</i>'nın bulunmadığının doğrulandığı,</p> <p>ve</p> <p>(ff) Üretim süresi boyunca <i>Xylella fastidiosa</i> belirtilerinin bulunmadığı “(cc)” maddesinde belirtilen arazi ya da şüpheli belirtilerin gözlemlendiği</p>
--	--	--

		<p>arazilerde testlerin yapıldığı ve <i>Xylella fastidiosa</i>'nın bulunmadığının doğrulandığı,</p> <p>(ii) Arazideki her bir bitki türünü temsil eden ve en uygun zamanlarda alınan örnekler, uluslararası kabul görmüş metodlara göre yapılan testlerle <i>Xylella fastidiosa</i>'nın bulunmadığının doğrulandığı,</p> <p>(iii) Bitkilerin, <i>Xylella fastidiosa</i> ve onun bilinen bütün vektörlerinin bulaşmasını engelleyecek kapalı kaplar ve ambalajlarla taşındığı,</p> <p>(iv) Bitki partilerinin ihracata en yakın zamanda, resmi görsel incelemeye tabi tutulduğu, belirti gösteren bitkiler öncelikli olmak üzere, tüm bitkilerden numune alınarak %99 güvenilirlik seviyesinde %1 oranında örnekleme şeması kullanılarak uluslararası geçerliliği olan moleküler test yöntemlerinden birine tabi tutulduğu ve yapılan testlerde <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>(v) İhracattan hemen önce, bitki partilerinin <i>Xylella fastidiosa</i>'nın bilinen tüm vektörlerine karşı bitki sağlığı uygulamalarına tabi tutulduğu,</p> <p>veya</p> <p>ç) <i>Xylella fastidiosa</i>'nın var olup olmadığının bilinmediği menşeli ve tüm üretim sezonu boyunca, in vitro içerisinde yetiştirilen bitkilerde;</p> <p>(i) Bitkilerin üretildiği arazinin adı,</p> <p>(aa) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından alanın ISPM 10'a göre denetlendiği ve <i>Xylella fastidiosa</i> ve vektörlerinden ari olduğu,</p> <p>(bb) <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörleri aracılığıyla girişine karşı fiziksel olarak korunduğu,</p>
--	--	---

			<p>(cc) Yılda en az iki kez uygun zamanlarda resmî kontrollerin gerçekleştirildiği, ve (çç) Üretim süresi boyunca, bitkilerde <i>Xylella fastidiosa</i>'nın semptomlarının ve vektörlerinin üretim yerinde gözlenmediği, üretim yerinde şüpheli belirtiler varsa, bu şüpheli bitkilere yapılan testlerde <i>Xylella fastidiosa</i>'ya rastlanmadığının doğrulandığı, (ii) <i>Xylella fastidiosa</i>'nın vektörleri aracılığıyla bulaşmasını önlemek amacıyla bitkilerin bu tekniklere uygun kapalı bir kaptaki steril koşullar altında taşınmış olduğu, ve (iii) Bütün hayatını <i>Xylella fastidiosa</i>'dan arı alanda geçiren ve yapılan test sonucu <i>Xylella fastidiosa</i>'dan arı bulunan veya (c)-(i) maddesindeki şartları karşılayan anaç bitkiden steril koşullar altında çoğaltılan ve test sonucu <i>Xylella fastidiosa</i>'dan arı bulunan tohumlardan üretildiği, Bitki sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
86.	Tohumları hariç dikim amaçlı <i>Coffea</i> sp. ve <i>Polygala myrtifolia</i> L. bitkileri.	<i>Xylella fastidiosa</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin; a) İhracattan önce en az üç yıl veya üç yaşından küçük bitkilerde, yaşamları boyunca ISPM 4'e göre vetejetasyon dönemlerinde gerekli önlemlerin alındığı, <i>Xylella fastidiosa</i>'nın görülmediği bir üretim alanında yetiştirilmiş olduğu, ve b) Bitki partilerinin ihracata en yakın zamanda, resmî görsel incelemeye tabi tutulduğu, belirti gösteren bitkiler öncelikli olmak üzere tüm bitkilerden numune alınarak %99 güvenilirlik seviyesinde %5 oranında örnekleme şeması kullanılarak uluslararası geçerliliği</p>

			<p>olan moleküler test yöntemlerinden birine tabi tutulduğu ve yapılan testlerde <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>ve</p> <p>c) <i>Polygala myrtifolia</i> L. tohum hariç dikim amaçlı bitkileri için üretim yerinden hareket etmesine en yakın zamanda, belirti gösteren bitkiler öncelikli olmak üzere tüm bitki lot/partilerinin resmî makroskobik muayeneye tabi tutulduğu ve <i>Xylella fastidiosa</i> etmeni yönünden uluslararası standartlara göre %99 güvenilirlik seviyesinde %5 oranında örnekleme yapılarak teste tabi tutulduğu ve yapılan testlerde bitkilerin <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
87.	Tohumları hariç dikim amaçlı <i>Lavandula</i> , <i>Nerium</i> , <i>Salvia</i> L. ve bitkileri	<i>Xylella fastidiosa</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari üretim alanında yetiştirildikleri ve üretilen arazinin adı,</p> <p>(i) İhracattan önce en az üç yıl veya üç yaşından küçük bitkilerde, yaşamları boyunca ISPM 4'e göre vetejetasyon dönemlerinde gerekli önlemlerin alındığı, <i>Xylella fastidiosa</i>'nın görülmediği bir alanda, yetiştirilmiş olduğu,</p> <p>ve</p> <p>(ii) Ari üretim alanında yetiştirilen bitkilerin yıllık resmî denetime tabi tutuldukları dönem boyunca uygun zamanlarda bitkilerden numune alınarak %99 güvenilirlik seviyesinde %5 oranında örnekleme şeması kullanılarak uluslararası geçerliliği olan test yöntemlerine tabi tutularak bitkilerin <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun doğrulandığı,</p> <p>veya</p>

		<p>b) Köksüz bitkiler dışındaki bitkiler için;</p> <p>(i) Bitkilerin ihracatından önce Ulusal Bitki Koruma Organizasyon tarafından en az bir yıllık bir süre içerisinde denetlenmiş ve onaylanmış üretim yerinde yetiştirildiği,</p> <p>(ii) Üretim yeri ve üretim yerini çevreleyen 200 metrelik alanda uygun zamanda gerçekleştirilen; testleri de içeren resmî denetimler sonucu <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğu tespit edilen alandan üretildiği,</p> <p>(iii) Yıllık resmî denetime tabi olan bir üretim yerinde uygun zamanlarda uluslararası standartlara göre bitkilerden numune alınarak %99 güvenilirlik seviyesinde %5 oranında örnekleme şeması kullanılarak uluslararası geçerliliği olan test yöntemlerine tabi tutularak bitkilerin <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun doğrulandığı,</p> <p>(iv) İhracattan hemen önce üretim yerinde, her bitki lot/partisinin resmî makroskobik muayeneye tabi tutulduğu ve <i>Xylella fastidiosa</i> etmeni yönünden uluslararası standartlara göre %99 güvenilirlik seviyesinde %5 oranında örnekleme yapılarak teste tabi tutulduğu ve yapılan testlerde bitkilerin <i>Xylella fastidiosa</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>(v) Üretim yerinde <i>Xylella fastidiosa</i> vektörünün varlığına dair bir tespit bulunan durumlarda, vektörü kontrol altına almak için kimyasal ve kültürel önlemlerin uygulandığı,</p> <p>ve</p> <p>(vi) Bitkilerin vejetasyon periyodu boyunca tam fiziksel koruma altında yetiştirildiği ve uygulanan hijyen tedbirleriyle, kullanılan alet veya ekipmanların</p>
--	--	---

			<p><i>Xylella fastidiosa</i>'nın yayılışının önlenmesinin garanti altına alındığı,</p> <p>c) Köklenmemiş çeliklerde: (a) veya (b) paragrafında belirtilen gereksinimlere uygun olarak yetiştirilmiş anaç bitkilerden elde edilen bitkilerden olduğu, veya</p> <p>ç) <i>Xylella fastidiosa</i>'nın yokluğunun doğrulanmadığı menşeli ve vejetasyon periyodu boyunca in vitro olarak üretilen bitkilerde:</p> <p>(i) Bitkilerin yetiştirildiği üretim arazisinin;</p> <p>(aa) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM 10'a göre <i>Xylella fastidiosa</i> ve onun vektörlerinden ari üretim arazisinden olduğunun onaylandığı,</p> <p>(bb) <i>Xylella fastidiosa</i> ve onun vektörlerinin girişine karşı fiziksel olarak korunduğu,</p> <p>(cc) uygun zamanlarda yılda en az iki defa resmî kontrollerin yapıldığı,</p> <p>(çç) Vejetatif dönem boyunca bitkilerde, <i>Xylella fastidiosa</i> semptomlarının bulunmadığı, bununla birlikte üretim arazisinde onun vektörlerinin bulunduğu veya şüpheli semptomlar gözlemlendiğinde test yapılarak <i>Xylella fastidiosa</i> bulunmadığının doğrulandığı,</p> <p>(ii) Bitkilerin bu tekniklere uygun kapalı kaplarda steril koşullarda <i>Xylella fastidiosa</i> enfeksiyonu ve vektörlerine bulaşma olasılığını ortadan kaldıracak şekilde taşınmış olduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>	
88.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Xylella fastidiosa</i> 'nın konukçu bitkileri	<i>Xylella fastidiosa</i> 'nın bilinmeyen ülkeler	varlığı	Bitkilerin <i>Xylella fastidiosa</i> için, bütünü temsil eden örneklerinin uygun test metodlarıyla resmî testlerden geçtiği, bu testlerde zararlı organizma ve

			hastalığı taşıyabilme ihtimali olan herhangi bir vektöre rastlanılmadığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
89.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Lavandula</i> L bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin, a) <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'den ari olduğu bilinen bir üretim alanında yetiştirilmiş olduğu, veya b) Son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerinde yapılan kontrollerde bitkilerde <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'nin neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği, veya c) <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'nin neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin kontrolden hemen sonra söküldüğü ve imha edildiği ve kalan bitkilerden her lottan temsili olarak bir numunenin analize alınarak <i>Candidatus</i> Phytoplasma solani'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
90.	Tohumları hariç dikim amaçlı <i>Crataegus</i> L. bitkileri	<i>Phyllosticta solitaria</i> varlığı bilinen ülkeler.	Son vejetasyon periyodu boyunca <i>Phyllosticta solitaria</i> 'nın hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
91.	Tohumları hariç dikim amaçlı <i>Cydonia</i> , <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> , <i>Ribes</i> L. ve <i>Rubus</i> L. bitkileri	Aşağıda yer alan konukçularda bulunan ilgili zararlı organizmaların var olduğu bilinen ülkeler menşeli, İlgili zararlı organizmalar; — <i>Fragaria</i> L. için; Arabis mosaic nepovirus Phytophthora fragariae var. fragariae Raspberry ringspot nepovirus Strawberry crinkle cytorhabdovirus Strawberry mild yellow edge potex virus	Son vejetasyon periyodu boyunca <i>Phyllosticta solitaria</i> 'nın ve diğer virüs, viroid ve phytoplasmaların hiçbir belirtisinin üretim yeri ve yakın çevresinde görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

		<p>Strawberry latent ringspot nepovirus Tomato black ring nepovirus <i>Xanthomonas fragariae</i> —<i>Malus</i> Mill. için; <i>Phyllosticta solitaria</i> —<i>Prunus</i> L. için; Apricot chlorotic leafroll phytoplasma <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> —<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch için; <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> —<i>Pyrus</i> için; <i>Phyllosticta solitaria</i> —<i>Ribes</i> L. için —<i>Rubus</i> L. için; Arabis mosaic nepovirus Raspberry ringspot nepovirus Strawberry latent ringspot nepovirus Tomato black ring nepovirus —Yukarıda yer alan tüm bitki türleri için; İlgili virus ve virus benzeri organizmalar</p>	
92.	<p>Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Prunus</i> spp. bitkileri: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus x blirean</i> André, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> (Hansen) Koehne, <i>Prunus cardica</i> Fenzl & Fritsch, <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>institia</i> (L.) Schneid., <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>italica</i> (Borkh.) Gams, <i>Prunus dulci</i> (Mill.) Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> L. H. Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i></p>	<p>Plum pox virus'un varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>a) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin: i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum pox virus yönünden, resmî bir teste tabi tutularak arı bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği, veya ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle Plum pox virus yönünden resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı</p>

	Lindl., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus. simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl. ve <i>Prunus</i> spp.'nin Plum pox virus'e duyarlı diğer türleri		organizmadan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, ve b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon periyodu boyunca, ilgili zararlı organizmanın yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği, ve c) Üretim yerinde diğer virüs ve virüs benzeri organizmaların neden olduğu belirtileri gösteren bitkilerin tamamen uzaklaştırıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
93.	Dikim amaçlı tüm <i>Prunus</i> spp. bitkileri	a) Tomato ringspot virus'un varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar b) Tohum hariç, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, American plum line pattern virus'un varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar	a) Bitkilerin; i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar açısından resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, veya ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, ve b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon periyodu

			boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
94.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Rubus</i> spp. bitkileri	a) Tomato ringspot virus, Tobacco streak virus black raspberry latent strain'in varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar b) Raspberry leaf curl virus, Cherry rasp leaf virus'un varlığının bilindiği ülkeler menşeli olanlar	a) Bitkilerin; yumurtaları dâhil yaprak bitlerinden ari olduğu, ve b) Bitkilerin; i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, veya ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle en azından ilgili zararlı organizmalar yönünden resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, ve (c) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon periyodu boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
95.	Doku kültürü, polen ve tohumları hariç dikim amaçlı <i>Euphorbia pulcherrima</i> Klotzsch, <i>Fragaria</i> L. ve <i>Rubus</i> L bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre <i>Eotetranychus lewisi</i> 'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya

			<p>b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Eotetranychus lewisi</i>'den ari olarak oluşturulan bir alandan üretildiği ve alanın adı,</p> <p>veya</p> <p>c) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Eotetranychus lewisi</i>'den ari olarak oluşturulan bir üretim yerinde üretildiği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
96.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Fragaria L.</i> bitkileri	<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense, <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini ve <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin;</p> <p>i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmî bir teste tabi tutularak ari bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,</p> <p>veya</p> <p>ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,</p> <p>ve</p> <p>b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon periyodu boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

97.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Fragaria</i> L. bitkileri	<i>Aphelenchoides besseyi</i> , <i>Aphelenchoides fragariae</i> , <i>Ditylenchus dipsaci</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler menşeli	Bitkilerin; a) Son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki bitkilerde ilgili organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği, veya b) Doku kültürü söz konusu olduğunda, bu kültürün, (a) maddesindeki şartlara uyan bitkilerden elde edildiği veya uygun resmî nematolojik testlere tabi tutularak ilgili organizmalardan ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
98.	Tohumları hariç, dikim amaçlı <i>Fragaria</i> spp. bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; <i>Anthonomus signatus</i> ve <i>Anthonomus bisignifer</i> 'den ari olduğu bilinen bir alan menşeli olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
99.	Tohumları dışında dikim amaçlı <i>Fuchsia</i> Plumier ex L. bitkileri	<i>Aculops fuchsiae</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Üretim yerinde <i>Aculops fuchsiae</i> 'nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve ihracattan hemen önce bitkilerin kontrol edildiği ve <i>Aculops fuchsiae</i> 'den ari bulunduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
100.	Palmae (Arecaceae) familyasına ait meyve ve tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> konukçusu dikim amaçlı tüm bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Üretim yerinde Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıt altına alındığı ve denetlendiği, ve b) Üretim yerinde, son bir yıl içerisinde her üç ayda bir ve ihracattan hemen önce resmî olarak kontrol edildiği, <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> 'a ilişkin herhangi bir belirtiyeye rastlanmadığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
101.	Palmae (Arecaceae) familyasına ait meyve ve tohumları hariç taban gövde çapı 5 cm üzerinde dikim amaçlı bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) Tüm yetiştirme dönemi boyunca <i>Paysandisia archon</i> 'un varlığı bilinmeyen bir ülkede yetiştirildiği,

			<p>veya</p> <p>b) Tüm yetiştirme dönemi boyunca, ilgili ISPM'e göre Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından oluşturulan <i>Paysandisia archon</i>'dan ari bir alanda yetiştirildiği,</p> <p>veya</p> <p>c) İhracattan önce en az iki yıllık bir dönem süresince, aşağıdaki şartlara sahip bir üretim yerinde yetiştirildiği;</p> <p>i) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kayıt altına alındığı ve denetlendiği,</p> <p>ve</p> <p>ii) Bitkilerin <i>Paysandisia archon</i>'un girişine karşı tam fiziksel korumalı bir yerde muhafaza edildiği,</p> <p>ve</p> <p>iii) İhracattan hemen öncesi de dahil, her yıl uygun zamanlarda yapılan 3 resmî kontrol süresince, <i>Paysandisia archon</i>'un hiçbir belirtisinin görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
102.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Palmae</i> (Arecaceae) bitkileri	Coconut lethal yellowing phytoplasma ve Coconut cadang-cadang viroid'in varlığı bilinen ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) Coconut lethal yellowing phytoplasma ve Coconut cadang-cadang viroid'den ari olduğu bilinen alanlardan olduğu ve üretim yeri ve yakın çevresinde son vejetasyon periyodu boyunca ilgili zararlı organizmaların hiçbir belirtisinin görülmediği,</p> <p>veya</p> <p>b) Bitkilerde, Coconut lethal yellowing phytoplasma ve Coconut cadang-cadang viroid'in son vejetasyon periyodu boyunca hiçbir belirtisinin görülmediği ve üretim yerinde ilgili organizmalar ile bulaşık olduğu</p>

			düşünülen bitkilerin üretim yerinden uzaklaştırıldığı ve bitkilerin <i>Haplaxius crudus</i> 'dan temizlemek için uygun bir muameleye tabi tutulduğu, veya c) Doku kültürü ortamında olduğu takdirde, bitkilerin (a) ve (b)'de açıklanan şartları karşıladığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
103.	<i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. ve <i>Vallisneria</i> sp. bitkileri	Tüm ülkeler	Köklerin, nematodlar yönünden, temsili bir numunenin, zararlıların tespiti için uygun yöntemler kullanılarak test edildiğine ve bu testlerde nematodların bulunmadığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
104.	Meyve hariç <i>Aegle</i> , <i>Aeglopsis</i> , <i>Afraegle</i> , <i>Atalantia</i> Corr., <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swing., <i>Calodendrum</i> , <i>Choisya</i> , <i>Clausena</i> Burm., <i>Limonia</i> Gaertner, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> , <i>Swinglea</i> , <i>Triphasia</i> ve <i>Vepris</i> Comm. ex Juss., bitkileri, tohumları ve bunların melezleri ile <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle ve <i>Poncirus</i> Raf. tohumları ve bunların melezleri	Tüm ülkeler	Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre Narenciye yeşillenme hastalığı etmeni olan <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter africanus</i> , <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter americanus</i> ve <i>Candidatus</i> <i>Liberibacter asiaticus</i> 'den ari olduğu bilinen ülkede yetiştirildiği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
105.	Meyve ve tohum hariç <i>Calodendrum capense</i> (L.) Thunb., <i>Casimiroa edulis</i> La Llave, <i>Choisya ternata</i> Kunth, <i>Citroncirus</i> , <i>Clausena anisata</i> (Willd.) Benth., <i>Murraya koenigii</i> (L.) Sprengel, <i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack, <i>Rutaceae</i> , <i>Vepris</i> Comm. ex Juss. <i>Vepris lanceolata</i> (Lam.) G. Don, <i>Vepris nobilis</i> (Delile) Mziray, <i>Zanthoxylum</i> sp. ve <i>Zanthoxylum asiaticum</i> (L.) Appelhans et al. bitkileri,	Tüm ülkeler	Bitkilerin: a) <i>Trioza erytraeae</i> 'nin varlığı bilinmeyen ülkede yetiştirildiği, veya b) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre bitkilerin <i>Trioza erytraeae</i> 'den ari olduğu tespit edilen alanda yetiştirildiği, veya c) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlenen ve kayıt altına alınan bir üretim yerinde yetiştirildiği ve bu bitkilerde, <i>Trioza</i>

			<p><i>erytrae</i>'nin girişine karşı tam bir fiziksel koruma sağlandığı, ve İhracattan önceki bir yıllık yetiştirme süresi boyunca, <i>Trioza erytrae</i>'nin, bulaşmasına karşı korunan bir üretim alanında yetiştirildiği, ve İhracattan en az bir yıl önce, uygun zamanlarda iki resmî kontrol yapıldığı ve bu alanda <i>Trioza erytrae</i>'ye dair hiçbir iz görülmediği, ve İhracattan önce, üretim yerinden ayrıldıktan sonraki bulaşmayı önleyecek şekilde işlendiği ve paketlenildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
106.	<p>Meyve ve tohumları hariç <i>Aegle</i>, <i>Aeglopsis</i>, <i>Afraegle</i>, <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corr., <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i>, <i>Citropsis</i> (Engl.) Swingle & M. Kellerm., <i>Clausena</i> Burm., <i>Eremocitrus</i>, <i>Esenbeckia</i>, <i>Glycosmis</i> Corr., <i>Limonia</i> Gaertner, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i>, <i>Swinglea</i>, <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i>, <i>Vepris</i> Comm. ex Juss. ve <i>Zanthoxylum</i> bitkileri</p>	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) <i>Diaphorina citri</i>'den ari ülkede yetiştirildiği, veya b) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre bitkilerin <i>Diaphorina citri</i>'nin olmadığı alanda yetiştirildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
107.	<p><i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ve bunların melezzlerine ait meyveleri</p>	Tüm ülkeler	<p>Meyveler pedikülsüz (sap) ve yapraksız olmalı ve ambalajında menşesine ilişkin uygun bir işaret bulunmalıdır.</p>
108.	<p>Tohum ve meyveleri hariç <i>Naringi</i> Adans. ve <i>Swinglea</i> bitkileri</p>	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>'den ari olduğu resmî kontrollerle belirlenen bir ülke menşeli olduğu,</p>

			<p>veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e göre menşee ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından belirlenen <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i>'den ari alanda üretildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
109.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ve bunların melezlerine ait meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>'den ari olduğu belirlenmiş bir ülke menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Menşee ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>'den ari olduğu belirlenmiş bir alan menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) Menşee ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>'den ari olduğu belirlenmiş bir üretim yeri menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>ç) Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>'ye karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı ve</p> <p>Meyvelerin, Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından sodium orthophenylphenat veya benzer başka bir madde ile uygulamaya tabi tutulduğu,</p> <p>ve</p>

			<p>İhracattan önce uygun zamanlarda yapılan resmî incelemelerde, meyvelerde <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> belirtilerinin görülmediği, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya d) Endüstriyel işleme için kullanılacak meyveler söz konusu olduğunda, ihracattan önceki resmî kontrollerde meyvelerin <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> belirtilerinin görülmediği, ve Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> ve <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i>'ye karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı, ve Kayıt altına alınmış onaylanmış paketleme tesislerinde depolama ve işleme yapıldığı, ve Meyveler, meyvelerin endüstriyel işleme için kullanıldığı bilgisi ve izlenebilirlik kodunu içeren bir etiket taşıyan ayrı ayrı paketlerde sevk edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
110.	<i>Citrus</i> L., ve <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. ve bunların melezlerine ait meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Pseudocercospora angolensis</i>'den arı olduğu belirlenmiş bir ülke menşeli olduğu, veya</p>

			<p>b) Üretim alanında ve onun yakın çevresinde, son vejetasyon periyodu boyunca, <i>Pseudocercospora angolensis</i>'in hiçbir belirtisinin görülmediği, veya</p> <p>c) Yapılan uygun bir resmî kontrole göre, üretildiği araziden hasat edilen hiçbir meyvede <i>Pseudocercospora angolensis</i>'in belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
111.	<i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> ve bunların melezlerine ait meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Phyllosticta citricarpa</i>'dan arılığı belirlenmiş bir ülke menşeli olduğu, veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e göre yapılan kontrol ve denetimler sonucunda üretim alanında <i>Phyllosticta citricarpa</i>'nın görülmediği, veya</p> <p>c) İlgili ISPM'e göre yapılan kontrol ve denetimler sonucunda üretim yerinde <i>Phyllosticta citricarpa</i>'nın görülmediği, ve</p> <p>İlgili ISPM'e göre yapılan analizde <i>Phyllosticta citricarpa</i>'dan ari olduğu, veya</p> <p>ç) Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Phyllosticta citricarpa</i>'ya karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı ve</p> <p>Vejetasyon dönemi boyunca resmî incelemelerde, meyvelerin <i>Phyllosticta citricarpa</i>'dan ari olduğu, ve</p>

			<p>İhracattan önce uygun zamanlarda yapılan resmî kontrollerde, meyvelerin <i>Phyllosticta citricarpa</i>'dan ari olduğu, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya d) Endüstriyel işleme için kullanılacak meyveler söz konusu olduğunda, ihracattan önceki resmî kontrollerde meyvelerde <i>Phyllosticta citricarpa</i> belirtilerinin görülmediği, ve Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Phyllosticta citricarpa</i>'ya karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı, ve Kayıt altına alınmış onaylanmış paketleme tesislerinde depolama ve işleme yapıldığı, ve Meyveler, meyvelerin endüstriyel işleme için kullanıldığı bilgisi ve izlenebilirlik kodunu içeren bir etiket taşıyan ayrı ayrı paketlerde sevk edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
112.	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Poncirus</i> Raf. ve bunların melezleri ile <i>Mangifera</i> L. ve <i>Prunus</i> L. meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Tephritidae</i> familyasına ait zararlı organizmalardan arılığı belirlenmiş bir ülke menşeli olduğu, veya (b) İlgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerle <i>Tephritidae</i> familyasına ait zararlı organizmalardan arılığı belirlenmiş bir alan menşeli olduğu, c) Üretim yeri ve yakın çevresinde, son vejetasyon periyodu başlangıcından itibaren ve hasattan önceki 3</p>

			ay boyunca aylık olarak yapılan resmî kontrollerde, <i>Tephritidae</i> familyasına ait zararlı organizmaların hiçbir izinin gözlemlenmediği ve üretim yerinden hasat edilen meyvelerde yapılan resmî kontrollerde söz konusu etmenin izlerinin tespit edilmediği, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya ç) Meyveye zarar vermeden <i>Tephritidae</i> familyasına ait zararlı organizmalara karşı etkili olan yöntemlerin biriyle uygulamaya tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
113.	Tohum ve meyveleri hariç; köklü veya yetiştirme ortamı ile birlikte bulunan; <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp. ve <i>Strelitziaceae</i> bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Radopholus similis citrus race</i> ve <i>Radopholus similis</i> 'den ari olduğu bilinen ülkeler menşeli olduğu, veya b) Son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerini temsil edecek şekilde alınan toprak ve kök örneklerinin resmî bir nematolojik teste tabi tutulduğu ve <i>Radopholus similis citrus race</i> ve <i>Radopholus similis</i> 'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
114.	<i>Capsicum L.</i> , <i>Momordica L.</i> , <i>Solanum aethiopicum L.</i> , <i>Solanum macrocarpon L.</i> ve <i>Solanum melongena L.</i> meyveleri, tohumlarla kaplanan sapsar dışındaki <i>Asparagus officinalis L.</i> bitkileri, canlı polen, bitki doku kültürleri, tohumlar ve tahılları dışında <i>Zea mays L.</i> bitkileri; <i>Chrysanthemum L.</i> , <i>Dianthus L.</i> ve <i>Pelargonium l'Hérit</i> bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin, a) İhracattan önce resmî bir denetime tabi tutulduğu ve <i>Spodoptera frugiperda</i> 'dan ari bulunan bir üretim yeri menşeli olduğu, veya b) Orijin ülkesinde Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından tescil edilmiş ve denetlenen bir alan menşeli olduğu veya

			<p>c) İhracattan önceki son üç ay içinde resmî denetimleri yapıldığı ve bitkilerde <i>Spodoptera frugiperda</i> varlığının tespit edilmediği;</p> <p>veya</p> <p>ç) Üretim yerinin <i>Spodoptera frugiperda</i> girişine karşı fiziksel izolasyona sahip olduğu ve üretim tesisinden ihracat öncesine kadar izlenebilirliğinin sağlandığı;</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
115.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Musa</i> spp. bitkileri ve taze meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin:</p> <p>a) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i>'nin tüm ırklarından ari olduğu bilinen alan menşeli olduğu ve uygun bir dönem başlangıcından itibaren, üretim yeri veya onun yakın çevresinde, <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i>'nin hiçbir belirtisinin gözlenmediği,</p> <p>b) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i> ile ilgili mevzuata göre veya buna eşdeğer bir sistem altında üretilmiş bir ülke menşeli olduğu,</p> <p>c) Kabul edilebilir metotlara göre resmî karantina testlerine tabi tutularak <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>cubense</i>'den ari olduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
116.	<i>Mangifera indica</i> L, <i>Persea americana</i> Mill, <i>Prunus</i> L, Cucurbitaceae, Lauraceae familyasının bitkileri ve taze meyveleri ile <i>Citrus</i> L meyveleri	Tüm ülkeler	<p>a) <i>Aulacaspis tubercularis</i>'den ari olduğu bilinen ülkeler menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e göre yapılan kontrol ve denetimler sonucunda üretim alanında <i>Aulacaspis tubercularis</i>'in görülmediği,</p> <p>veya</p> <p>c) İlgili ISPM'e göre yapılan kontrol ve denetimler sonucunda üretim yerinde <i>Aulacaspis tubercularis</i>'in görülmediği,</p>

			<p>veya</p> <p>ç) Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Aulacaspis tubercularis</i>'e karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı,</p> <p>ve</p> <p>Vejetasyon dönemi boyunca resmî incelemelerde, meyvelerin <i>Aulacaspis tubercularis</i>'den ari olduğu,</p> <p>ve</p> <p>İhracattan önce uygun zamanlarda yapılan resmî kontrollerde, meyvelerin <i>Aulacaspis tubercularis</i>'den ari olduğu,</p> <p>ve</p> <p>Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri,</p> <p>veya</p> <p>d) Endüstriyel işleme için kullanılacak meyveler söz konusu olduğunda, ihracattan önceki resmî kontrollerde meyvelerde <i>Aulacaspis tubercularis</i>'in belirtilerinin görülmediği,</p> <p>ve</p> <p>Bitkilerin üretildiği üretim arazisi ve yakın çevresinde <i>Aulacaspis tubercularis</i>'e karşı uygun muameleler ve kültürel uygulamaların yapıldığı,</p> <p>ve</p> <p>Kayıt altına alınmış onaylanmış paketleme tesislerinde depolama ve işleme yapıldığı,</p> <p>ve</p> <p>Meyveler, meyvelerin endüstriyel işleme için kullanıldığı bilgisi ve izlenebilirlik kodunu içeren bir etiket taşıyan ayrı ayrı paketlerde sevk edildiği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
117.	Tohum ve meyve hariç, <i>Vitis L.</i> bitkileri	Tüm ülkeler	Bitkilerin;

			<p>a) Son iki vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki anaç bitkilerde <i>Grapevine flavescence dorée phytoplasma</i> ve <i>Xylophilus ampelinus</i>'un belirtilerinin görülmediği, ve b) <i>Grapevine flavescence dorée phytoplasma</i> ve <i>Xylophilus ampelinus</i>'un varlığı bilinen ülkeler menşeli asma bitkilerinin bir sertifikasyon programı dahilinde üretildiği ve resmî bir teste tabi tutularak <i>Grapevine flavescence dorée phytoplasma</i> ve <i>Xylophilus ampelinus</i>'dan ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
118.	<p><i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. ve <i>Citrus sinensis</i> Pers. dışındaki <i>Citrus</i> L., <i>Capsicum</i> (L.), <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch ve <i>Punica granatum</i> L. meyveleri</p>	<p>Afrika Kıtası, Cape Verde, Saint Helena, Madagaskar, La Reunion, Mauritius ve İsrail</p>	<p>(a) Meyvelerin, ilgili Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Standartlarına uygun olarak <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olduğu kabul edilen bir ülkeden geldiği, veya (b) Meyvelerin, ISPM 4'e uygun olarak, menşe ülkesindeki ulusal bitki koruma örgütü tarafından <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olarak belirlenen bir araziden geldiği, veya (c) Meyvelerin: (i) Menşe ülkesindeki ulusal bitki koruma örgütü tarafından ISPM 10 uyarınca <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olarak belirlenen üretim yerinden geldiği, ve (ii) Yetiştirme sezonu boyunca ve ihracattan önce uygun zamanlarda üretim yerinde, ISPM 31'e uygun olarak %95 güven düzeyinde en az %2'lik bir bulaşma seviyesinin tespit edilmesini sağlayacak yoğunlukta</p>

		<p>görsel bir inceleme ve semptomların görülmesi durumunda tahrip edici numune alma dahil olmak üzere resmî denetimlere tabi tutulmuş ve <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>ve</p> <p>(iii) Meyvelerin üretim yeri bilgileri,</p> <p>veya</p> <p>(ç) Meyvelerin</p> <p>(i) Menşe ülkesinin ulusal bitki koruma örgütü tarafından denetlenen onaylı bir üretim yerinde üretildiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) ISPM 14 uyarınca <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ariliği sağlamak için, menşe ülkenin ulusal bitki koruma örgütü tarafından uygulama veya hasat sonrası işleme tabi tutulduğu,</p> <p>ve</p> <p>(iii) İhracattan önce, <i>Thaumatotibia leucotreta</i> ariliği açısından, ISPM 31'e uygun olarak %95 güven düzeyinde ve semptomların görülmesi halinde tahrip edici örnekleme de dahil olmak üzere, en az %2 düzeyinde bulaşma tespit edilmesini sağlayacak yoğunlukta resmî denetimlere tabi tutulduğunun ve <i>Thaumatotibia leucotreta</i> içermediğinin tespit edildiği,</p> <p>ve</p> <p>(iv) Üretim yerinin <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olduğu ve kullanılan hasat sonrası yapılan uygulamaların ayrıntıları;</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
--	--	--

119.	<i>Citrus sinensis</i> Pers. meyveleri	Afrika Kıtası, Cape Verde, Saint Helena, Madagaskar, La Reunion, Mauritius ve İsrail	<p>a) Meyvelerin, ilgili ISPM'ye uygun olarak <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olduğu kabul edilen bir ülkeden geldiği,</p> <p>(b) ISPM 4'e uygun olarak meyvelerin, menşe ülkesindeki ulusal bitki koruma örgütü tarafından <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olarak belirlenen bir araziden geldiği,</p> <p>(c) Meyvelerin:</p> <p>(i) Menşe ülkesindeki ulusal bitki koruma örgütü tarafından ISPM 10 uyarınca <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olarak belirlenen üretim yerinden geldiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) Yetiştirme sezonu boyunca ve ihracattan önce uygun zamanlarda üretim yerinde, ISPM 31'e uygun olarak % 95 güven düzeyinde en az % 2'lik bir bulaşma seviyesinin tespit edilmesini sağlayacak yoğunlukta görsel bir inceleme dahil olmak üzere ve semptomların görülmesi durumunda tahrip edici örnekleme dahil olmak üzere resmî denetimlere tabi tutulduğu ve <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olduğunun tespit edildiği,</p> <p>ve</p> <p>(iii) Üretim yeri bilgileri,</p> <p>veya</p> <p>(ç) Meyveler:</p> <p>(i) ISPM 10 uyarınca <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'dan ari olarak belirlenen bir üretim yerinde üretildiği,</p> <p>ve</p> <p>(ii) Aşağıdaki uygulamalara tabi tutulmuş olduğu:</p> <p>- İlgili ISPM 14 ve ISPM 42 uyarınca en az 16 gün boyunca 0 °C ila - 1 °C arasında soğuk işlem içeren</p>
------	--	--	---

			<p>etkili uygulama ve soğuk işlemin ihracatçı ülke tarafından her bir sevkiyat için kontrol edilmesi ve belgelenmediğinin belgelenmesi,</p> <p>veya</p> <p>ISPM 14'e uygun, meyvenin etinin soğuk işlem sıcaklığına kadar ön soğutulması adımı ve ardından en az 20 gün boyunca -1 °C ile +2 °C arasındaki bir sıcaklıkta soğuk işlem uygulanması yapıldığı; ön soğutma adımının, soğuk işlemin ve soğuk uygulamanın ihracatçı ülke tarafından her sevkiyat için ayrı yapıldığı, uygulamaya ilişkin belgelerin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından onaylandığı,</p> <p>veya</p> <p>- ISPM 14 uyarınca, meyve özünün uygulanan soğuk işlemin sıcaklığına kadar ön soğutma aşamasını içeren etkili uygulama, ardından - 1 °C ile +2 °C arasında ayarlanmış bir sıcaklıkta en az 20 gün boyunca soğuk işlem, ön soğutma aşamasının ve soğuk işlemin ihracatçı ülke tarafından her sevkiyat ve kontrol edilerek belgelendiği;</p> <p>veya</p> <p>- <i>Thaumatococcus danianus</i>'den arı olmasını sağlamak için etkili bir hasat sonrası işlem uygulandığı;</p> <p>veya</p> <p>- ISPM 14'e uygun olarak, meyve özünün 5 °C'ye kadar ön soğutma adımı ve ardından - 1 °C ile +2 °C arasında ayarlanmış bir sıcaklıkta en az 25 gün boyunca soğuk işlemden geçirilmesini içeren etkili bir uygulama, ön soğutma ve soğuk işlemin</p>
--	--	--	--

			<p>ihracatçı ülkenin ulusal bitki koruma örgütü tarafından her bir sevkiyat için belgelendiği ve kontrol edildiği;</p> <p>ve</p> <p>(iii) İhracattan önce <i>Thaumatotibia leucotreta</i>'nın varlığı açısından ISPM 31'e uygun olarak %95 güven düzeyinde ve semptomların görülmesi halinde tahrip edici örnekleme de dahil olmak üzere en az %2'lik bir bulaşma seviyesinin tespit edilmesini sağlayacak yoğunlukta resmî denetimlere tabi tutulmuş olduğu,</p> <p>ve</p> <p>(iv) Üretim yeri bilgileri, kullanılan hasat sonrası işlemin ayrıntılarını veya soğuk işlem sıcaklık değerleri ve söz konusu uygulanan soğuk işlemin süresini belirten bir bitki sağlığı sertifikasıyla birlikte sunulduğu,</p> <p>ve</p> <p>(v) Soğuk işlemin sevk sırasında uygulanması durumunda, bitki sağlığı sertifikasına ek olarak, işlemin uygulanmasına ilişkin kayıtların hazır bulundurulduğu,</p> <p>Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.</p>
120.	<p>Doku kültüründe tohum, polen ve bitkiler hariç dikim amaçlı <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus casica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i>, <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i>, <i>Pyrus</i> ve <i>Rosa</i> L., bitkileri</p>	<p>Avustralya, Bangladeş, Butan, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Çin, Eswatini, Guam, Hindistan, Endonezya, İran, Japonya, Kenya, Laos, Malezya, Mauritius, Mikronezya, Karadağ, Nijerya, Kuzey Kore, Kuzey Mariana Adaları, Pakistan, Palau, Papua Yeni Gine, Filipinler, Reunion, Güney Afrika, Güney Kore, Sri Lanka,</p>	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından kurulan bir alanda <i>Aleurocanthus spiniferus</i>'tan ari olarak üretildiği ve alanın adı,</p> <p>veya</p> <p>b) İlgili ISPM'e uygun olarak menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından belirlenen</p>

		Tayvan, Tanzanya, Tayland, Uganda, Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri	<p>bir üretim yerinde <i>Aleurocanthus spiniferus</i>'dan ari yetiştirildiği,</p> <p>i) İhracattan önceki son bir yıl içinde uygun zamanlarda resmî denetimlere tabi tutulduğu,</p> <p>ii) Bitkilerin üretim yerinden ayrıldıktan sonra istilayı önleyecek şekilde paketlenip taşındığı,</p> <p>c) İhracattan önce <i>Aleurocanthus spiniferus</i>'dan ari hale getirmek için bir işleme tabi tutulduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
121.	Tohum hariç dikim amaçlı <i>Malus</i> Mill. bitkileri	Tomato ringspot virus veya Cherry rasp leaf virus'un varlığı bilinen ülkeler	<p>a) Bitkilerin;</p> <p>i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle, resmî bir teste tabi tutularak ari bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği,</p> <p>veya</p> <p>ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son üç vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle ilgili zararlı organizmalar yönüyle resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmalardan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği,</p> <p>ve</p> <p>b) Üretim yerindeki bitkiler veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son vejetasyon periyodu boyunca, ilgili zararlı organizmaların yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
122.	Tohumları hariç, dikim amaçlı <i>Malus</i> Mill. bitkileri	<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali'nin varlığı bilinen ülkeler	Bitkilerin;

			<p>a) <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali'den ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin: i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali yönünden, resmî bir teste tabi tutularak ari bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği, veya ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son altı vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali yönünden resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, ve (c) Üretim yeri veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon periyodu boyunca, <i>Candidatus</i> Phytoplasma mali'nin yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
123.	Tohum hariç, dikim amaçlı <i>Cydonia</i> ve <i>Pyrus</i> bitkileri	<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri'nin varlığı bilinen ülkeler	Bitkilerin; a) <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri'den ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Tohumdan üretilenler hariç, bitkilerin: i) Zorunlu bir sertifikasyon sistemi dâhilinde, uygun şartlarda muhafaza edilen ve uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle

			<p><i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri yönünden, resmî bir teste tabi tutularak ari bulunduğu belirlenmiş materyalden doğrudan elde edildiği, veya ii) Uygun şartlarda muhafaza edilen ve son altı vejetasyon periyodu boyunca, en az bir defa, uygun indikatör bitkiler veya eşdeğer metotlar kullanılmak suretiyle <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri yönünden resmî testlemeye tabi tutulduğu ve bu testlerde söz konusu zararlı organizmadan ari olduğu bulunan materyalden doğrudan elde edildiği, ve c) Üretim yeri veya yakın çevresindeki duyarlı bitkiler üzerinde, son üç vejetasyon periyodu boyunca, <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri'nin yol açtığı hiçbir hastalık belirtisinin gözlenmediği veya hastalık belirtisine benzer belirtiler gösteren bitkilerin bulunduğu yerde imha edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
124.	<i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> ve <i>Vaccinium</i> L. meyveleri	Kanada, Meksika ve ABD	<p>Meyvelerin; a) Menşе ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre belirlenen, <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita packardii</i>'den ari bir alanda üretildiği, veya b) Menşе ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre belirlenen, <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita packardii</i>'den ari bir üretim yerinde üretildiği ve resmî kontrollerin bitkilerin büyüme sezonu süresince uygun zamanlarda meyve örnekleri üzerinde yapıldığı,</p>

			<p>ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya c) <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita packardii</i>'den ariliğın sağlanması için etkili bir uygulamanın yapıldığı ve hasat sonrası etkili bir işleme yöntemine tabi tutulduğu ve uygulama bilgileri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
125.	<i>Malus</i> Mill. ve <i>Pyrus</i> meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre menşé ülkenin <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> ve <i>Anthonomus quadrigibbus</i>'dan ari olduğu, veya b) Menşé ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> ve <i>Anthonomus quadrigibbus</i>'dan ariliğı belirlenen bir alandan üretildiğı, veya c) <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> ve <i>Anthonomus quadrigibbus</i>'dan ari olduğuna yönelik resmî kontrollerin vejetasyon süresi boyunca uygun zamanlarda meyve örnekleri üzerinde yapıldığı, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya ç) <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> ve <i>Anthonomus quadrigibbus</i>'dan ariliğın sağlanması için hasat sonrasında etkili bir uygulamanın yapıldığı ve uygulama bilgileri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
126.	<i>Malus</i> Mill. meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin;</p>

			<p>a) İlgili ISPM'e göre menşee ülkenin <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita inopinata</i> ve <i>Rhagoletis pomonella</i>'dan ari olduğu, veya b) Menşee ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita inopinata</i> ve <i>Rhagoletis pomonella</i>'dan arılığı belirlenen bir alandan üretildiği, veya c) <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita inopinata</i> ve <i>Rhagoletis pomonella</i>'dan ari olduğuna yönelik resmî kontrollerin vejetasyon süresi boyunca uygun zamanlarda meyve örnekleri üzerinde yapıldığı, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya ç) <i>Grapholita prunivora</i>, <i>Grapholita inopinata</i> ve <i>Rhagoletis pomonella</i>'dan arılığın sağlanması için hasat sonrasında etkili bir uygulamanın yapıldığı ve uygulama bilgileri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
127.	<p>Tohumları ve meyveleri hariç dikim amaçlı <i>Sauropus androgynus</i>, <i>Solanum nigrum</i>, <i>Ecballium elaterium</i>, <i>Abelmoschus esculentus</i>, <i>Calotropis procera</i>, <i>Cucumis sativus</i>, <i>Crossandra infundibuliformis</i> (syn. <i>Crossandra undulifolia</i>), <i>Croton bonplandianum</i>, <i>Papaver somniferum</i>, <i>Hibiscus cannabinus</i>, <i>Gossypium hirsutum</i>, <i>Coccinia grandis</i>, <i>Vigna unguiculata</i>, <i>Chrysanthemum indicum</i>, <i>Datura stramonium</i>, <i>Citrullus lanatus</i>, <i>Cucurbita maxima</i>, <i>Glycine max</i>,</p>	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin; a) İlgili ISPM'e göre menşee ülkenin Tomato leaf curl New Delhi virus'dan ari olduğu, veya b) Menşee ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre Tomato leaf curl New Delhi virus'dan arılığı belirlenen bir alanda üretildiği, ve</p>

	<p><i>Eclipta prostrata</i>, <i>Benincasa hispida</i>, <i>Luffa aegyptiaca</i>, <i>Solanum arcuanum</i>, <i>Solanum cheesmaniae</i>, <i>Solanum chilense</i>, <i>Solanum galapagense</i>, <i>Solanum peruvianum</i>, <i>Solanum pimpinellifolium</i>, <i>Solanum melongena</i>, <i>Momordica charantia</i>, <i>Cucurbita moschata</i>, <i>Daucus carota</i>, <i>Sonchus oleraceus</i>, <i>Carica papaya</i>, <i>Sechium edule</i>, <i>Solanum tuberosum</i>, <i>Physalis minima</i>, <i>Luffa cylindrica</i>, <i>Benincasa fistulosa</i>, <i>Cucurbita pepo</i>, <i>Cucumis melo</i>, <i>Momordica dioica</i>, <i>Lagenaria siceraria</i>, <i>Capsicum</i> sp. bitkileri</p>		<p>c) Bir partiden rastgele alınan bitkiler ve şüpheli semptomlara sahip bitkiler, büyüme mevsimi boyunca veya ihracattan önce RT-PCR yöntemiyle test edildiği ve Tomato leaf curl New Delhi virus'dan ari olduğu bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
128.	<p><i>Solanaceae</i> meyveleri</p>	<p>Avustralya, Amerika ve Yeni Zelanda</p>	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin <i>Bactericera cockerelli</i>'den ari olduğu, veya b) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Bactericera cockerelli</i>'den arılığı belirlenen bir alandan elde edildiği, veya c) İhracattan önceki son üç ay boyunca, <i>Bactericera cockerelli</i>'nin varlığına yönelik resmî kontrol ve sürveylerin sürdürüldüğü; zararlıdan arılığın garanti altına alınmasını sağlayan uygulamaların yapıldığı; ihracattan önce bitkilerin üretim yerleri ve yakın çevresi de dahil olmak üzere meyve örneklerinin kontrol edildiği, ve Meyvelerin izlenebilirlik bilgileri, veya ç) Menşe ülke Uusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ihracattan önceki üç ay boyunca sürdürülen</p>

			resmî kontrol ve sürveylere dayanılarak, <i>Bactericera cockerelli</i> 'den ari alan olarak belirlenen böcekten izole üretim yerinin adı ve izlenebilirlik bilgileri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
129.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. ve <i>Solanum melongena</i> L. meyveleri	Tüm ülkeler	Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin <i>Neoleucinodes elegantalis</i> 'den ari olduğu, veya b) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Neoleucinodes elegantalis</i> 'den arılığı belirlenen bir alandan elde edildiği, veya c) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Neoleucinodes elegantalis</i> 'den ari bir alandan elde edildiği ve resmî kontrollerin bitkilerin büyüme sezonu süresince uygun zamanlarda meyve örnekleri üzerinde yapıldığı, ve İzlenebilirlik bilgileri, veya ç) İhracattan önceki üç ay boyunca sürdürülen resmî kontrol ve sürveylere dayanılarak, menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, <i>Neoleucinodes elegantalis</i> 'den ari alan olarak belirlenen böcekten izole üretim üretildiği arazisinin adı ve izlenebilirlik bilgileri, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
130.	<i>Capsicum</i> L. ve <i>Solanum lycopersicum</i> L.meyveleri	Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Amerika Birleşik Devletleri	Meyvelerin; a) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre

			<p><i>Prodiplosis longifila</i>'dan ari olarak oluřturulan ve ari alanda üretildiđi ve alanın adı, veya b) Menőe ÷lkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre <i>Prodiplosis longifila</i>'dan ari olarak kurulan bir üretim yerinden üretildiđi ve üretim yerinde temsili meyve örnekleri üzerinde yapılan kontroller dahil vejetasyon periyodu boyunca uygun zamanlar resmî denetim ve sürveylerin yapıldıđı <i>Prodiplosis longifila</i>'dan ari olduđu ve yapılan izlenebilirlik ile ilgili bilgileri, veya c) Menőe ÷lkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından resmî denetimlere dayalı olarak <i>Prodiplosis longifila</i>'dan ari olarak kurulan fiziksel izolasyonu sađlanmış bir üretim sahasından iki ay boyunca <i>Prodiplosis longifila</i>'dan ari olarak üretildiđi ve izlenebilirlik bilgileri, veya ç) Meyvelerde <i>Prodiplosis longifila</i>'dan ariliđi sađlamak için etkin bir mücadele yöntemi kullanıldıđı, meyvelerin hasat sonrası işleme yöntemine tabi tutulduđu yönteminin ayrıntıları, mücadele yönteminin bilgileri ve izlenebilirlik bilgisi, Bitki Sađlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
131.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. ve <i>Solanum melongena</i> L. meyveleri	Tüm ÷lkeler	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre menőe ÷lkenin <i>Keiferia lycopersicella</i>'dan ari olduđu, veya b) Menőe ÷lkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Keiferia</i></p>

			<p><i>lycopersicella</i>'dan arılığı belirlenen bir alanda üretildiği, veya c) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından üretim yerinin, ihracattan önceki son üç ay boyunca yapılan resmî kontrollerde <i>Keiferia lycopersicella</i>'dan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
132.	<i>Solanum melongena</i> L. meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin; a) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin <i>Thrips palmi</i>'den ari olduğu, veya b) İlgili ISPM'e göre menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından meyvelerin, <i>Thrips palmi</i>'den ari bir alan orijinli olduğu, veya c) Meyveler ihracattan hemen önce resmî olarak incelenmiş ve <i>Thrips palmi</i>'den ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasının belirtilmelidir.</p>
133.	Honduras, Meksika, Sri Lanka ve Tayland menşeli <i>Momordica charantia</i> L. meyveleri hariç <i>Momordica</i> L. meyveleri	Tüm ülkeler	<p>Meyvelerin; a) Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Thrips palmi</i>'den ari olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre <i>Thrips palmi</i>'den ari olarak oluşturulan, bir alan menşeli olduğu. Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
134.	<i>Momordica</i> L. meyveleri	Honduras, Mexico, Sri Lanka ve Thailand	<p>a)Menşe ülkenin Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Thrips palmi</i>'den ari olduğu,</p>

		<p>b) <i>Thrips palmi</i>'ye karşı fiziksel korumaya sahip bir arazi menşeli olduğu, veya</p> <p>c) İhracattan hemen önce, ISPM 31'e uygun olarak tanımlanan temsili bir numunenin resmî muayenesi ile <i>Thrips palmi</i>'den ari bir fiziksel korumaya sahip bir arazi menşeli olduğu; ve Hasat edildikten sonra <i>Thrips palmi</i> ile bulaşmayı önleyecek şekilde işlenmiş ve paketlenmiş olduğu, ve Meyvelerin üretim yeri bilgileri, veya</p> <p>(ç) <i>Thrips palmi</i>'den ari olmayı sağlamak için aşağıdaki gerekliliklerin tümünün yerine getirilmesini içeren etkili uygulamalar yapılarak üretildiği:</p> <p>(i) Üretim yerinde:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tüm üretim sezonu boyunca <i>Thrips palmi</i>'yi tespit etmek için yapışkan tuzaklarla donatıldığı,- Tüm üretim sezonu boyunca haftada en az üç kez denetime tabi tutulmuş ve semptomlardan ve/veya ilgili zararlıdan ari bulunduğu; <i>Thrips palmi</i>'nin varlığından şüphelenilmesi durumunda, bu zararlının yokluğunu sağlamak için uygun işlemlerin yapıldığı,-<i>Thrips palmi</i>'nin alternatif konukçularını ortadan kaldırmak için etkili yabancı ot mücadelesine tabi tutulduğu ve <p>(ii) Meyvelerin <i>Thrips palmi</i>'ye karşı etkili kültürel kontrol önlemlerine tabi tutulduğu,</p> <p>(iii) Hasat edilen meyvelerin:</p>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">- Hasat edildikten sonra bulaşmayı önleyecek şekilde elleçlenerek paketleme tesislerine taşındığı,- Meyvelerin <i>Thrips palmi</i> larva veya erginlerinden arındırmak için firçalandığı ve dezenfektan içeren suyla yıkandığı,- Paketleme tesisinden çıktıktan sonra bulaşmayı önleyecek şekilde işlendiği ve paketlenildiği,- İhracattan hemen önce, ISPM31'e uygun olarak tanımlanan temsili bir numunenin resmî muayenesi ile <i>Thrips palmi</i> semptomlarından ari bulunduğu, <p>(iv) Meyvelerin üretim yeri bilgileri, Bitki sağlık sertifikasında belirtilmelidir.</p>
135.	<i>Capsicum</i> L. meyveleri	<i>Anthonomus eugeni</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Meyvelerin; a) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Anthonomus eugeni</i> 'den ari olduğu tespit edilen alanda yetiştirilmiş olduğu, veya b) İhracatçı ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından, ilgili ISPM'e göre üretim yerinde bitkilerin <i>Anthonomus eugeni</i> 'den ari olduğu ve ihracattan iki ay öncesinde, üretim yerinde ve yakın çevresinde en az ayda bir yürütülen resmî kontrollerde, <i>Anthonomus eugeni</i> 'den ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
136.	<i>Capsicum</i> L.ve <i>Solanum</i> L meyveleri	<i>Bactrocera latifrons</i> 'ın varlığı bilinen ülkeler	Meyvelerin; a) Menşé ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre <i>Bactrocera latifrons</i> 'dan ari olduğu bilinen ülke menşeli olduğu,

			<p>veya</p> <p>b) Menş e ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre oluşturulan <i>Bactrocera latifrons</i>'dan ari bir alanda üretildiği,</p> <p>veya</p> <p>c) Son vejetasyon periyodunun başlangıcından bu yana üretim yerinde ve yakın çevresinde hasattan önceki üç ay boyunca en az ayda bir kez gerçekleştirilen resmî denetimlerde, <i>Bactrocera latifrons</i> belirtisi gözlemlenmediği ve uygun resmî incelemelerde, üretim yerinde hasat edilen meyvelerin hiçbirinde <i>Bactrocera latifrons</i> belirtilerini göstermediği,</p> <p>ve</p> <p>İzlenebilirlik bilgisi,</p> <p>veya</p> <p>ç) Meyvelere, <i>Bactrocera latifrons</i>'dan ari olmasını sağlamak için mücadele yöntemi uygulandığı veya hasat sonrası etkili bir işleme tabi tutulduğu,</p> <p>ve</p> <p>Mücadele yönteminin veya hasat sonrası arıtma yönteminin, mücadele yöntemi veya hasat sonrası arıtma yönteminin ayrıntıları,</p> <p>Bitki Sağlık sertifikasında belirtilmelidir.</p>
137.	<i>Annona</i> L.ve <i>Carica papaya</i> L meyveleri	<i>Bactrocera dorsalis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler	<p>Meyvelerin;</p> <p>a) Menş e ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre <i>Bactrocera dorsalis</i>'den ari olduğu bilinen ülke menş eli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Menş e ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre oluşturulan <i>Bactrocera dorsalis</i>'den ari bir alanda üretildiği,</p>

			<p>veya</p> <p>c) Son vejetasyon periyodunun başlangıcından bu yana üretim yerinde ve yakın çevresinde hasattan önceki üç ay boyunca en az ayda bir kez gerçekleştirilen resmî kontrollerde, <i>Bactrocera dorsalis</i> belirtisinin gözlemlenmediği ve uygun resmî kontrollerde, üretim yerinde hasat edilen meyvelerin hiçbirinde <i>Bactrocera dorsalis</i> belirtisinin görülmediği ve izlenebilirlik bilgisi,</p> <p>veya</p> <p>ç) Meyvelere, <i>Bactrocera dorsalis</i>'den ari olmasını sağlamak için mücadele yöntemi uygulandığı veya hasat sonrası etkili bir işleme tabi tutulduğu ve mücadele yönteminin ve hasat sonrası işleme yönteminin ayrıntıları,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
138.	<i>Psidium guajava</i> L. meyveleri	<i>Bactrocera dorsalis</i> ve <i>Bactrocera zonata</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	<p>Meyvelerin;</p> <p>a) Menşe ülke Ulusal Bitki koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre <i>Bactrocera dorsalis</i> ve <i>Bactrocera zonata</i>'dan ari olduğu bildirilen ülke menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ISPM'e göre <i>Bactrocera dorsalis</i> ve <i>Bactrocera zonata</i>'dan ari bir alanda üretildiği,</p> <p>veya</p> <p>c) Son vejetasyon periyodunun başlangıcından bu yana üretim yerinde ve yakın çevresinde hasattan önceki üç ay boyunca en az ayda bir kez gerçekleştirilen resmî denetimlerde <i>Bactrocera dorsalis</i> ve <i>Bactrocera zonata</i>'nın hiçbir belirtisinin</p>

			<p>gözlemlenmediği ve uygun resmî kontrollerde, üretim yerinde hasat edilen meyvelerin hiçbirinde belirtilerin göstermediği ve izlenebilirlik bilgisinin, veya</p> <p>ç) <i>Bactrocera dorsalis</i> ve <i>Bactrocera zonata</i>'dan ari olmasını sağlamak için mücadele yöntemi uygulandığı veya hasat sonrası etkili bir işleme tabi tutulduğu ve mücadele yönteminin mücadele yöntemi veya hasat sonrası işleme yönteminin ayrıntıları, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir</p>
139.	<i>Allium</i> spp. bitkileri	Tüm ülkeler	<p>Bitkilerin;</p> <p>a) <i>Ditylenchus dipsaci</i> ve <i>Stromatinia cepivora</i>'dan ari üretim yerinde yetiştirildiği ve bu üretim yerinin kayıt altına alınarak orijin ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından denetlendiği, ve</p> <p>b) Üretim yerinde vejetasyon periyodunun başından itibaren, <i>Ditylenchus dipsaci</i> zararı ve <i>Stromatinia cepivora</i>'dan kaynaklanan hiçbir hastalık belirtisinin görülmediği,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
140.	<i>Gossypium</i> spp. elyafı	Tüm ülkeler	<p>a) Elyafın bitki ve çiğit artıkları içermediği, veya</p> <p>b) Balyalanmış ve çırcırlanmış pamuk elyafı MeBR etkili maddeli fümigant ile 80 gr/m³ dozunda 48 saat süre ile 20 derece sıcaklıkta fümigasyon işlemine tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
141.	<i>Gossypium</i> spp. yağlık çiğiti ve linteri	Tüm ülkeler	<p>Yağlık çiğit ve linterinin MeBR etkili maddeli fümigant ile 80 gr/m³ dozunda 48 saat süre ile 20 derece sıcaklıkta fümigasyon işlemine tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

142.	<i>Gossypium</i> spp. telefi	Tüm ülkeler	Telefin, MeBR etkili maddeli fümigant ile 80 gr/m3 dozunda 48 saat süre ile 20 derece sıcaklıkta fümigasyon işlemine tabi tutulduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
143.	Ekim materyali <i>Gossypium</i> spp. tohumları	Tüm ülkeler	Tohumun temizlenerek asitle delinte edilmiş olduğu ve son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerinde <i>Colletotrichum gossypii</i> 'nin hiçbir belirtisinin görülmediği ve ürünü temsil eden tohum miktarının testlendiği ve bu testler sonucunda tohumun <i>Colletotrichum gossypii</i> 'den ari bulunduğu Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
144.	Ekim materyali <i>Zea mays</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	Tohumların; a) Bitki sağlığı önlemleri ile ilgili ISPM'e göre <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> 'den ari olduğu tespit edilen ülke menşeli olduğu, veya b) Bitki sağlığı önlemleri ile ilgili ISPM'e göre menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> 'den ari olduğu tespit edilen alan menşeli olduğu, veya c) <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> yönünden resmî bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metotlar kullanılarak, ürünü temsil edecek kadar bir örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmadan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
145.	Ekim materyali <i>Helianthus annuus</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	Tohumların; a) <i>Plasmopara halstedii</i> 'den ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya

			<p>b) <i>Plasmopara halstedii</i>'nin bütün ırklarına dayanıklı olan çeşitlerden elde edilenler hariç, üretim alanında bulunan tohumların, <i>Plasmopara halstedii</i>'ye karşı uygun bir muameleye tabi tutulduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) Tohumların</p> <p>i. Tohumluk üretim alanlarında üretim sezonu boyunca hastalığın seyri dikkate alınarak en az iki denetimin yapıldığı,</p> <p>ii. Bu denetimlerde <i>Plasmopara halstedii</i> etmenine ait hastalık belirtili bitki sayısının %5 den fazla olmadığı ve belirti gösteren bitkilerin kontrolden hemen sonra sökülerek imha edildiği,</p> <p>iii. Son kontrolden sonra hiçbir bitkide <i>Plasmopara halstedii</i> etmenine ait hastalık belirtisinin görülmediği, her lottan temsili olarak bir numunenin analize alınarak <i>Plasmopara halstedii</i>'den ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
146.	Ekim materyali <i>Solanum lycopersicum</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	<p>Tohumların;</p> <p>a) Uygun bir asit ekstraksiyon yöntemiyle veya uluslararası alanda eşdeğer olduğu onaylanmış bir diğer yöntemle elde edilmiş olduğu,</p> <p>ve</p> <p>b) <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>, <i>Xanthomonas vesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>euvesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>perforans</i>, <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>gardneri</i> ve Potato spindle tuber viroid'in varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>c) Son vejetasyon periyodu boyunca üretim yerindeki bitkilerde <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp.</p>

			<p><i>michiganensis</i>, <i>Xanthomonas vesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>euvesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>perforans</i>, <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>gardneri</i> ve Potato spindle tuber viroid'in neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmediği, veya ç) <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>, <i>Xanthomonas vesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>euvesicatoria</i>, <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> pv. <i>perforans</i>, <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>gardneri</i> ve Potato spindle tuber viroid yönünden resmî bir teste tabi tutulduğu ve bu testin kabul edilebilir metodlar kullanılarak, ürünü temsil edecek kadar örnek üzerinde yapıldığı ve bu teste göre bu organizmalardan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
147.	Ekim materyali <i>Solanum lycopersicum</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	<p>Tohumların; a) Tomato mottle mosaic virus, Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid, Pepper chat fruit viroid'in varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya b) Tomato mottle mosaic virus, Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid, Pepper chat fruit viroid'in varlığı bilinen alanlarda; i) Tohumların Tomato mottle mosaic virus, Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid,</p>

			<p>Pepper chat fruit viroid'den ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, ve ii) Üretim yerinin adı, ve iii) Tomato mottle mosaic virus, Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid, Tomato planta macho viroid Pepper chat fruit viroid yönünden Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu ve ari bulunduğu, Bitki Sağlığı Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
148.	Ekim materyali <i>Capsicum annum</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	<p>Tohumların; a) Tomato mottle mosaic virus, Tomato apical stunt viroid, Pepper chat fruit viroid'in varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya b) Tomato mottle mosaic virus, Tomato apical stunt viroid, Pepper chat fruit viroid'in varlığı bilinen alanlarda; i) Tohumların Tomato mottle mosaic virus, Tomato apical stunt viroid, Pepper chat fruit viroid'den ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, ve ii) Üretim yerinin adı, ve iii) Tomato mottle mosaic virus, Tomato apical stunt viroid, Pepper chat fruit viroid yönünden Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu ve ari bulunduğu, Bitki sağlığı sertifikasında belirtilmelidir.</p>
149.	Ekim materyali <i>Solanum melongena</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	Tohumların;

			<p>a) Tomato chlorotic dwarf viroid'in varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu, veya b) Tomato chlorotic dwarf viroid'in varlığı bilinen alanlarda; i) Tohumların Tomato chlorotic dwarf viroid'den ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu, ve ii) Üretim yerinin adı, ve iii) Tomato chlorotic dwarf viroid, yönünden Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
150.	Ekim materyali <i>Capsicum annum</i> L. ve <i>Solanum lycopersicum</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	<p>Tohumların; a) Tomato brown rugose fruit virus'e dayanıklı olduğu, veya b) Elde edildiği (anaç) bitkilerin, Tomato brown rugose fruit virus'u tespit etmek için uygun zamanda yapılan resmî kontroller sonucunda Tomato brown rugose fruit virus'un ortaya çıkmadığı belirlenen bir üretim sahasında üretilmiş olduğu ve üretim yerinin izlenebilirliği, i) 30'dan fazla ana bitkiden elde edilen tohum partisi söz konusu olduğunda; tohum partisi işlenmeden önce Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) yöntemi kullanılarak analize tabi tutulduğu ve Tomato brown rugose fruit virus'den ari bulunduğu veya ii) 30'a eşit veya daha az ana bitkiden elde edilen tohum partisi söz konusu olduğunda; belirtilen</p>

			<p>tohumların veya ana bitkilerin Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) yöntemi kullanılarak analize tabi tutulduğu ve Tomato brown rugose fruit virus'den ari bulunduğu,</p> <p>ve</p> <p>c) Ana bitkilerin üretim sahasının izlenebilirliğini sağlayan bilgiler</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
151.	Ekim materyali <i>Cucurbita pepo</i> tohumları	Tüm ülkeler	<p>Tohumların;</p> <p>a) Tomato leaf curl New Delhi virus'un varlığı bilinmeyen ülkeler menşeli olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Tomato leaf curl New Delhi virus'un varlığı bilinen alanlarda;</p> <p>i) Tohumların ari olduğu bilinen bir üretim yeri menşeli olduğu,</p> <p>ve</p> <p>ii) Üretim yerinin adı,</p> <p>ve</p> <p>iii) İhracatçı ülke tarafından Tomato leaf curl New Delhi virus yönüyle Polymerase Chain Reaction (PCR) metodu kullanılarak analize tabi tutulduğu ve söz konusu etmenler yönüyle ürünün ari bulunduğu,</p> <p>ve</p> <p>c) Üretildiği bitkilerin bulunduğu alanda Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından üretim sezonu boyunca ilgili ISPM'e göre yapılan resmî kontrollerde Tomato leaf curl New Delhi virus vektörü <i>Bemisia tabaci</i> izine rastlanmadığı ve zararlıdan ari olduğu,</p> <p>veya</p> <p>ç) Üretildiği bitkilerin bulunduğu üretim yerinde Tomato leaf curl New Delhi virus vektörü <i>Bemisia</i></p>

			<i>tabaci</i> 'nin eradikasyonu için, bitkilerin uygun bir muameleye tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
152.	Ekim materyali <i>Vicia faba</i> L. tohumu	Tüm ülkeler	İlgili ISPM'e göre, <i>Ditylenchus dipsaci</i> 'den arı olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
153.	Ekim materyali <i>Medicago sativa</i> L. tohumları	Tüm ülkeler	Son vejetasyon periyodu boyunca, üretim yerinde <i>Ditylenchus dipsaci</i> 'nin hiçbir belirtisinin görülmediği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
154.	Ekim materyali <i>Medicago sativa</i> L. tohumları	<i>Clavibacter insidiosus</i> 'un varlığının bilindiği ülkeler	Tohumların; a) Son on yıldır yakın çevresi de dahil üretim yerinde <i>Clavibacter insidiosus</i> 'un varlığının bilinmediği ve tohum hasat edildiğinde, ekimden itibaren 4'üncü tam vejetasyon periyodunun henüz başlamamış olduğu ve önceki dönemlerde üründen birden fazla tohum hasatının olmadığı, veya b) Ürünün <i>Clavibacter insidiosus</i> 'a yüksek oranda dayanıklı olarak kabul edilen bir çeşide ait olduğu, veya c) Üretim yerinde veya yakınındaki herhangi bir <i>Medicago sativa</i> türüne ait üründen, son vejetasyon periyodu boyunca veya uygun yerlerde, son iki vejetasyon periyodu süresince, <i>Clavibacter insidiosus</i> 'un hiçbir belirtisinin görülmediği ve ürünün, ekimden önceki son üç yıl süresince, <i>Medicago sativa</i> türüne ait bitkinin olmadığı bir arazide yetiştirildiği, ve ç) <i>Medicago sativa</i> tohumu içerisinde yabancı madde oranının, ağırlığın %0.1'ini geçmediği,

			Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
155.	Ekim materyali <i>Oryza sativa</i> L. tohumları ve sofralık kavuzlu çeltik taneleri	Tüm ülkeler	Çeltiklerin; a) Uygun nematolojik testlerle resmî olarak test edildiği ve <i>Aphelenchoides besseyi</i> 'den ari bulunduğu, veya b) <i>Aphelenchoides besseyi</i> 'ye karşı uygun bir sıcak su muamelesi veya diğer uygun muamelelere tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
156.	Ekim materyali <i>Phaseolus</i> tohumları	Tüm ülkeler	Tohumların; a) <i>Xanthomonas phaseoli</i> pv. <i>phaseoli</i> 'den ari olduğu bilinen alanlar menşeli olduğu, veya b) Her lotu/partiyi temsil edecek miktarda örneğin test edilerek, test sonucunda <i>Xanthomonas phaseoli</i> pv. <i>phaseoli</i> 'den ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
157.	Ekim materyali <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ve <i>Triticum</i> x <i>Secale</i> tohumları	<i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	a) Tohumların <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu ve bu alanın adı, ve b) Üretim yerindeki bitkiler üzerinde, son vejetasyon periyodu boyunca, <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği; temsili tahıl örneklerinin hem hasat zamanında, hem de sevkiyattan önce alındığı; test edildiği ve bu testlerde <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'dan ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

158.	<i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. ve <i>Triticum</i> x <i>Secale</i> taneleri	<i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	a) Tanelerin <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın varlığı bilinmeyen alanlar menşeli olduğu ve bu alanın adı, veya b) Üretim yerindeki bitkiler üzerinde, son vejetasyon periyodu boyunca, <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'nın hiçbir belirtisinin görülmediği; temsili tahıl örneklerinin hem hasat zamanında, hem de sevkiyattan önce alındığı; test edildiği ve bu testlerde <i>Tilletia indica</i> ve <i>Tilletia barclayana</i> 'dan ari bulunduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
159.	<i>Thuja</i> L. ve <i>Taxus</i> L. hariç, iğne yapraklıların (Pinopsida) doğal dış yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki odunu: -Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları, -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri her türlü ürünün nakliyesinde kullanılmalı veya kullanılmasın ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri - Kalem olarak kullanılmak amacıyla minimum 82 °C'de 7 ile 8 günlük bir ısıtım işlemi kullanılarak işlendiği veya imal edildiğine dair kanıtı bulunan <i>Calocedrus decurrens</i> Torr. Florin odunu,	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler,	Odunların; a) Kabuğunun soyulmuş olduğu, <i>Monochamus</i> spp.'nin neden olduğu 3 mm'den büyük deliklerin bulunmadığı, ve b) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik ısıtım işlemi tabii tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Isıtım işleminin yapıldığını gösteren 'H.T' ibaresi odun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır. İşlem sonrasında ülkeden ayrılincaya kadar <i>Monochamus</i> spp. 'nin beklenen uçuş sezonu başlangıcı ve sonuna ilave edilen 4 haftalık bir güvenlik payı da hesaba katılarak, beyanda bulunan ülkeden uçuş sezonu dışında veya kabuksuz odun hariç <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> veya vektörü ile bulaşmanın önlenmesi için koruyucu bir örtü ile kaplandıktan sonra nakledildiği, veya

	- Orta çapı 12 cm'den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun		c) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m ³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri, veya ç) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapıldığı, aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) bilgileri, veya d) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.
160.	Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan (Pinopsida) elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler,	Odunların: a) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik ısı ile işleme tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Isıl işlemin yapıldığını gösteren 'H.T' ibaresi odun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır. İşlem sonrasında ülkeden ayrılıncaya kadar <i>Monochamus</i> spp. 'nin beklenen uçuş sezonu başlangıcı ve sonuna ilave edilen 4 haftalık bir güvenlik payı da hesaba katılarak, beyanda bulunan ülkeden uçuş sezonu dışında veya kabuksuz odun hariç <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> veya vektörü ile bulaşmanın önlenmesi için koruyucu bir örtü ile kaplandıktan sonra nakledildiği, veya

			<p>b) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m^3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri, veya</p> <p>c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.</p>
161.	<p><i>Thuja</i> L. ve <i>Taxus</i> L.hariç, iğne yapraklıların (Pinopsida) aşağıda belirtilen; Orta çapı 12 cm'den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odunu</p>	<p><i>Bursaphelenchus xylophilus</i>'un varlığı bilinen ülkeler,</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik ısıl işleme tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Isıl işlemin yapıldığını gösteren 'H.T' ibaresi odun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır. İşlem sonrasında ülkeden ayrılıncaya kadar <i>Monochamus</i> spp. 'nin beklenen uçuş sezonu başlangıcı ve sonuna ilave edilen 4 haftalık bir güvenlik payı da hesaba katılarak, beyanda bulunan ülkeden uçuş sezonu dışında veya kabuksuz odun hariç <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> veya vektörü ile bulaşmanın önlenmesi için koruyucu bir örtü ile kaplandıktan sonra nakledildiği,</p> <p>veya</p> <p>b) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m^3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri, veya</p>

			<p>c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır. veya ç) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapılarak, Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%), Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
162.	<p><i>Thuja L.</i> ve <i>Taxus L.</i>'nin aşağıda belirtilenleri dışındaki odunu: -Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p><i>Bursaphelenchus xylophilus</i>'un varlığı bilinen ülkeler,</p>	<p>Odunların; a) Kabuksuz olduğu, veya b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır, veya c) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıl işlemin sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren 'H.T' ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p>

			<p>veya</p> <p>ç) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri,</p> <p>veya</p> <p>d) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapıldığı, aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) bilgileri,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
163.	<p>İğne yapraklıların (Pinopsida) doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki odunu:</p> <p>-Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,</p> <p>Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p>Rusya, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Ukrayna</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) Kabuğunun soyulmuş olduğu, <i>Monochamus</i> spp.'nin neden olduğu 3 mm'den büyük deliklerin bulunmadığı,</p> <p>ve</p> <p>b) <i>Monochamus</i> spp., <i>Pissodes nemorensis</i>, <i>Pissodes strobi</i>, <i>Pissodes terminalis</i>, <i>Pissodes castaneus</i>, <i>Scolytus</i> spp. türlerinden arı alanlarda üretildiği ve üretim alanının adı,</p> <p>veya</p> <p>c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.</p> <p>veya</p> <p>ç) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıl işlemin sağlandığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

			<p>ve</p> <p>Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren 'H.T' ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p> <p>veya</p> <p>d) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri,</p> <p>veya</p> <p>e) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapıldığı, aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) bilgileri,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
164.	<p>İğne yapraklıların (Pinopsida) doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenlerin dışındaki odunu:</p> <p>-Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları,</p> <p>- Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p><i>Bursaphelenchus xylophilus</i>'un varlığı bilinen ülkeler ile Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna dışındaki ülkeler,</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) Kabuksuz olduğu ve üzerinde <i>Monochamus</i> spp.'nin yol açtığı, genişliği 3 mm'den büyük deliklerden arı olduğu,</p> <p>veya</p> <p>b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' işareti veya uluslararası kabul edilen başka bir işaret bulunmalıdır.</p> <p>veya</p> <p>c) Onaylı bir ürünle basınçlı kimyasal emdirme yapıldığı aktif bileşen, basınç (psi veya kPa) ve konsantrasyon (%) bilgileri,</p> <p>veya</p>

			<p>ç) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıtma işleminin sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p>
165.	Tamamı veya bir kısmı iğne yapraklılardan (Pinopsida) elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler ile Beyaz Rusya, Rusya, Kazakistan ve Ukrayna dışındaki ülkeler,	<p>Odonların;</p> <p>a) Kabuğu soyulmuş yuvarlak odundan üretildiği, veya</p> <p>b) Onaylı bir fümigasyon yapıldığı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri, veya</p> <p>c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20'nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı, veya</p> <p>ç) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıtma işleminin sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p>
166.	Orta çapı 12 cm'den küçük lif, yonga ve kâğıtlık odun	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler ile Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Ukrayna dışındaki ülkeler,	<p>Odonların;</p> <p>a) Kabuğu soyulmuş olduğu ve üzerinde <i>Monochamus spp.</i>'nin yol açtığı, genişliği 3 mm'den büyük deliklerden arı olduğu, ve</p> <p>b) Onaylı bir fümigasyon yapılmalı ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri,</p>

			<p>veya</p> <p>c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20'nin altına çekmek için fırında kurutma işlemi yapıldığı,</p> <p>veya</p> <p>ç) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıl işlemin sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p>
167.	İğne yapraklıların (Pinopsida) izole edilmiş kabukları	Tüm ülkeler	<p>Odunların;</p> <p>a) Onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum kabuk sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat) bilgileri, veya</p> <p>b) Odunun, öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik ısıl işleme tabi tutulduğu,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>ve</p> <p>Isıl işlemin yapıldığını gösteren "HT" ibaresi odun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p> <p>ve</p> <p>İşlem sonrasında ülkeden ayrılıncaya kadar <i>Monochamus</i> spp.'nin beklenen uçuş sezonu başlangıcı ve sonuna ilave edilen 4 haftalık bir güvenlik payı da hesaba katılarak, beyanda bulunan ülkeden uçuş sezonu dışında veya kabuksuz odun hariç <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> veya vektörü ile</p>

			bulaşmanın önlenmesi için koruyucu bir örtü ile kaplandıktan sonra nakledildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
168.	Doğal yuvarlak yüzeyini korumamış olanlar da dahil <i>Juglans L.</i> ve <i>Pterocarya Kunth</i> 'un aşağıda belirtilenlerin dışındaki, odunları -Kaplama levha üretimi amaçlı odun, -Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	ABD	Odunların; a) İlgili ISPM'e göre, <i>Geosmithia morbida</i> ve vektör <i>Pityophthorus juglandis</i> ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısı işlemi sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır. veya c)Odunun yuvarlak yüzeyi tamamen kesilerek kare şekli verilmiş olmalıdır.
169.	Doğal yuvarlak yüzeyini korumamış olanlar da dahil <i>Juglans L.</i> 'in aşağıda belirtilenlerin dışındaki, odunları -Kaplama levha üretimi amaçlı odun, -Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	<i>Garella musculana</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Odunların; a) İlgili ISPM'e göre, <i>Garella musculana</i> 'dan ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, ve b) Kabuğu soyulmuş odunlardan elde edildiği, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
170.	<i>Juglans L.</i> ve <i>Pterocarya Kunth</i> 'in ağacından elde edilen kabuklar, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları	ABD	Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısı işlemi sağlandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve

			Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.
171.	<i>Acer saccharum</i> Mars.'un doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler ve aşağıda belirtilenlerin dışındaki, odunları -Kaplama levha üretimi amaçlı odun, -Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	ABD ve Kanada	Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.
172.	<i>Acer saccharum</i> Mars.'un kaplama levha üretimi amaçlı odunu	ABD ve Kanada	Odunun, <i>Davidsoniella virescens</i> 'den ari olduğu bilinen alan menşeli olduğu ve kaplama levha üretimi amaçlı olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
173.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.'nun aşağıda belirtilenler dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler ve ham ahşaptan imal edilen mobilya ve diğer ürünler dahil, odunu -Yukarıda belirtilen ağaçların tamamından veya bazılarından elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	<i>Agrilus planipennis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler	a) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre kurulan, <i>Agrilus planipennis</i> 'den ari olduğu kabul edilen ve Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından arılığı bildirilen bir alandan elde edildiği, belirtilen zararlının varlığının resmî olarak teyit edildiği alan ve ormana en az 100 km uzaklıkta depolandığı ve üretim alanının adı, veya (b) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş ve resmî olarak denetlenen bir testiste en az 2,5 cm kalınlığında kabuk ve kabuk altı tabakasının soyulmuş olduğu, veya

			(c) Minimum 1 kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
174.	<p><i>Fraxinus L.</i>'nin aşağıda belirtilenler dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen ve ham ahşaptan imal edilen mobilya ve diğer ürünler dahil, odunu</p> <p>- <i>Fraxinus L.</i>'den elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p> <p>-Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p><i>Agrilus planipennis</i>'in varlığı bilinen ve <i>Agrilus planipennis</i> karşı tesis yaklaşımları dahil olmak üzere bu maddede belirlen bitki sağlığı önlemlerine yönelik protokol yapılan ülkeler</p>	<p>a) Kabuğu soyulmuş olmalıdır, ancak gözle görünür şekilde ayrı ve açıkça ayırt edilebilen herhangi bir sayıdaki, aşağıda şartları belirtilen kabuğu içerebilir.</p> <p>— Genişliği 3 cm'den az (uzunluğuna bakılmaksızın) veya</p> <p>— Genişlikleri 3 cm'den büyükse, her bir kabuk parçasının toplam yüzey alanı 50 cm²'den az</p> <p>b) Biçilmiş kerestelerin, kabuğu soyulmuş olmalı, yuvarlak keresteden üretilmiş olmalıdır.</p> <p>c) Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu veya Ulusal Bitki Koruma Organizasyonun yetkilendirdiği bir kurum tarafından onaylanmış bir ısı odasında, profili boyunca en az 70 °C olacak şekilde 1200 dakika süresince ısıtılmış olmalıdır.</p> <p>ç) Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından tanınan endüstriyel kurutma programları izlenerek en az iki hafta kurutulmuş olmalı ve kerestenin nihai nem içeriği, kuru madde yüzdesi olarak %10'u geçmemelidir.</p> <p>d) Odunun her bir bağı, farklı bir numara içermeli, ve "HT-KD" veya "Isıl İşlem Görmüş-Fırında Kurutulmuş" ifadesini içeren bir etiketi görünür şekilde taşınmalıdır.</p> <p>e) Kerestelerin;</p>

			<p>— Dişbudak kerestesinin Türkiye'ye ithalatında <i>Agrilus planipennis</i>'in bertarafına yönelik protokole uygun olduğu ifadesi,</p> <p>— İhraç edilen her bir özel kereste partisi/yığına karşılık gelen parti/palet numarası/numaraları;</p> <p>— Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından onaylı tesis(ler)in adı.</p> <p>— Isıl işlem uygulama süresi (1200 dakika), sıcaklığı (70 °C) ve kerestenin nihai nem içeriğinin, kuru madde yüzdesi olarak %10'u geçmediği Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
175.	<p><i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.,'nun aşağıda belirtilenler dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyen ve ham ahşaptan imal edilen mobilya ve diğer ürünler dahil, odunu</p> <p>-<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., 'den elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p> <p>-Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri.</p>	Kanada ve ABD	<p>a) Odunun menşe, <i>Agrilus planipennis</i>'den ari olduğu kabul edilen, menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e uygun olarak kurulmuş ve ormana en az 100 km uzaklıkta bulunan bir alandan elde edildiği. söz konusu zararlının varlığının resmî olarak teyit edildiği bilinen en yakın alanın adı</p> <p>veya</p> <p>b) Ahşap, ahşap boyunca minimum 1 kGy emilen doz elde etmek için iyonize ışınlamaya tabi tutulduğu Bitki sağlık sertifikasında belirtilmez.</p>
176.	Tamamı veya bir kısmı <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim.,	<i>Agrilus planipennis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler	Menşe ülke Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre kurulan, <i>Agrilus planipennis</i> 'den

	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.'den elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları		ari olduğu kabul edilen ve Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından arılığı bildirilen bir alandan elde edildiği, belirtilen zararlının varlığının resmî olarak teyit edildiği alan ve ormana en az 100 km uzaklıkta depolandığı ve üretim alanının adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
177.	<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. ve <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.'dan elde edilen soyulmuş kabuk ve kabuktan yapılan ürünler.	<i>Agrilus planipennis</i> 'in varlığı bilinen ülkeler	Menşe ülke Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre kurulan, <i>Agrilus planipennis</i> 'den ari olduğu kabul edilen ve Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından arılığı bildirilen bir alandan elde edildiği, belirtilen zararlının varlığının resmî olarak teyit edildiği alan ve ormana en az 100 km uzaklıkta depolandığı ve üretim alanının adı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
178.	<i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle <i>Albizia julibrissin</i> (Willd.) Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archidendron jiringa</i> (Jack) Nielsen, <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> (Wendl.) Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A. Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> von Müll., <i>Brachychiton populneus</i> (Schott & Endl.) Brown, <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium indicum</i> L., <i>Castanospermum australe</i> Cunn. & Fraser, <i>Citrus</i> ssp., <i>Cocculus laurifolius</i> (Roxb.) de Cand., <i>Corymbia ficifolia</i> (von Müll.) Hill & Johnson	Tüm ülkeler	Odunların; (a) İlgili ISPM'e göre <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> 'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> 'dan ari olarak oluşturulmuş bir alandan elde edildiği ve alanın adının, veya c) Tüm profili boyunca <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> 'dan arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, veya ç) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir

<p><i>Combretum kraussi</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina americana</i> Mill., <i>Erythrina corallo dendron</i> L., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Falcataria falcata</i> (L.) Greuter & Rankin, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Juss) Muell, <i>Howea forsteriana</i> (Moore & von Müll.) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa scabrella</i> Benth., <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Parkinsonia florida</i> (Benth. ex A. Gray) S. Wats., <i>Parkinsonia x sonorae</i> (Rose & I.M. Johnst.) J.E. Hawkins & Felger, <i>Persea americana</i> Mill., <i>Platanus mexicana</i> Moric., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Platanus x hispanica</i> Münchh., <i>Podalyria calyptata</i> (Retz.) Willd., <i>Populus fremontii</i> S. Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Hook., <i>Prosopis articulata</i> S. Watson, <i>Protium serratum</i> (Wall. ex Colebr.) Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Nee, <i>Quercus calliprinos</i> Webb, <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus lobata</i> Nee, <i>Quercus palustris</i> Münchh., <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thunb., <i>Shorea robusta</i> Gärtner, <i>Spathodea campanulata</i> Palisot de Beauv., <i>Spondias</i></p>		<p>zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.</p>
--	--	---

	<p><i>dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb. <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B. -E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. ve <i>Xylosma avilae</i> Sleumer,</p> <p>aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,</p>		
179.	<p><i>Alnus formosana</i> (Burkill) Makino, <i>Artocarpus chama</i>, Buch. Ham., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Bombax ceiba</i> L., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Ficus virens</i> Aiton, <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carr., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> Lindl., <i>Pyrus pseudocerasus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Styphnolobium</i></p>	<p><i>Apriona germari</i>'nin varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre <i>Apriona germari</i>'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya</p> <p>b) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Apriona germari</i>'den ari olduğu tespit edilen alandan elde edildiği olarak alanın adı, veya</p> <p>c) Tüm profili boyunca <i>Apriona germari</i>'den arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısl işleme tabi tutulduğu, veya</p>

	<p><i>japonicum</i> (L.) Schott, <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Trema tomentosum</i> (Roxb.) H. Hara, <i>Trema orientale</i> (L.) von Blume, <i>Triadica sebifera</i> (L.) mall, <i>Ulmus</i> L. ve <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ve <i>Xylosma</i> G. Forst. aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılсын veya kullanılmasın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,</p>		<p>ç) Minimum 1kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, veya d) Kabuksuz olduğu ve en büyük boyutta enine kesiti 20 cm'yi aşmadığı ve ilgili ISPM'e göre bir sülfürlü florür fümigasyon işleminden tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
180.	<p>Tamamen veya kısmen <i>Alnus formosana</i> (Burkill) Makino, <i>Artocarpus chama</i>. Buch. Ham., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Bombax ceiba</i> L., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth., <i>Camellia oleifera</i> Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L. <i>Ficus retusa</i> L., <i>Ficus virens</i> Aiton, <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carr., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> Lindl., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia</i></p>	<p><i>Apriona germari</i>'nin varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların; a) İlgili ISPM'e göre <i>Apriona germari</i>'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Apriona germari</i>'den ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya c) 2,5 cm'den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu veya ç) Odunun tüm profili boyunca <i>Apriona germari</i>'den arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta</p>

	<p><i>pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott, <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Trema tomentosum</i> (Roxb.) H. Hara, <i>Trema orientale</i> (L.) von Blume, <i>Triadica sebifera</i> (L.) Small, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw ve <i>Xylosma</i> G. Forst.'dan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p>		<p>kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
181.	<p><i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> von Bunge, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> (Miq.) Hance, <i>Crataegus phaenopyrum</i> (C.L.) Medik., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Oreocnide frutescens</i> Miq., <i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam, <i>Platanus x hispanica</i> Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pseudocyonia sinensis</i> (Dumont de Courset) Schneid., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. Ve <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen</p>	<p><i>Apriona rugicollis</i> varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların: a) İlgili ISPM'e göre <i>Apriona rugicollis</i>'den arı olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşee ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Apriona rugicollis</i>'den arı olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya c) Tüm profili boyunca <i>Apriona rugicollis</i>'den arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, veya ç) Minimum 1 kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, veya d) Kabuksuz olduğu ve en büyük boyutta enine kesiti 20 cm'yi aşmadığı ve ilgili ISPM'e göre sülfür florür fümigasyon işleminden tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

	<p>şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,</p>		
182.	<p>Tamamen veya kısmen <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> von Bunge, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl Citrus spp., <i>Cornus kousa</i> (Miq.) Hance, <i>Crataegus phaenopyrum</i> (C.L.) Medik., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Oreocnide frutescens</i> Miq., <i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam., <i>Platanus x hispanica</i> Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pseudocyonia sinensis</i> (Dumont de Courset) Schneid., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., ve <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino'dan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p>	<p><i>Apriona rugicollis</i> varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odonların: a) ISPM'e göre <i>Apriona rugicollis</i>'den ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Apriona rugicollis</i>'den ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya c) 2,5 cm'den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, veya ç) Tüm profili boyunca, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

183.	<p><i>Debregeasia saeneb</i> Forssk.) Hepper & Wood, <i>Ficus L.</i>, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid. , <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Morus L.</i>, <i>Populus L.</i>, <i>Prunus spp.</i>, <i>Pyrus spp.</i> ve <i>Salix L.</i> aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,</p>	<p><i>Apriona cinerea</i>'nın varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların; a) ISPM'e göre <i>Apriona cinerea</i>'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Apriona cinerea</i>'dan ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, c) Odunun tüm profili boyunca <i>Apriona cinerea</i>'dan arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, ç) Minimum 1 kGy emilimi doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, veya d) Kabuksuz olduğu ve en büyük boyutta enine kesiti 20 cm'yi aşmadığı ve ilgili ISPM'e uygun bir sülfürlü florür fumigasyon işleminden tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
184.	<p>Tamamen veya kısmen <i>Debregeasia saeneb</i> (Forssk.) Hepper & Wood, <i>Ficus L.</i>, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid., <i>Malus domestica</i> Borkh, <i>Morus L.</i>, <i>Populus L.</i>, <i>Prunus spp.</i>, <i>Pyrus spp.</i> ve <i>Salix L.</i>den elde edilen talaş yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p>	<p><i>Apriona cinerea</i>'nın varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların; a) İlgili ISPM'e göre <i>Apriona cinerea</i>'dan ari olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre oluşturulan <i>Apriona cinerea</i>'dan ari alandan elde edildiği alanın adı, veya c) 2,5 cm kalınlık ve genişlikten fazla olmayan parçalar halinde olduğu, veya</p>

			ç) Tüm profili boyunca, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
185.	<i>Acer L., Betula L., Elaeagnus Tournier ex L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. ve Ulmus L.,</i> aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; seviyadaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,	<i>Trirachys sartzus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	Odunların: a) İlgili ISPM'e göre <i>Trirachys sartzus</i> 'dan arı olduğu kabul edilen bir ülke menşeli olduğu, veya b) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Trirachys sartzus</i> 'dan arı olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya c) Tüm profili boyunca <i>Trirachys sartzus</i> 'dan arılığı sağlamak için, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemi tabi tutulduğu, veya ç) Minimum 1 kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, veya d) Kabuksuz olduğu ve en büyük boyutta enine kesiti 20 cm'yi aşmadığı ve ilgili ISPM'e uygun bir sülfür florür fumigasyon işleminden tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
186.	Tamamen veya kısmen <i>Acer L., Betula L., Elaeagnus Tournier ex L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill</i> 'den elde edilen talaş, parçacık, talaş, ahşap atığı veya hurda şeklinde ahşap, <i>Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L. ve Ulmus</i>	<i>Trirachys sartzus</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	Odunların; a) Menşe ülke Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından İlgili ISPM'e göre, <i>Trirachys sartzus</i> 'dan arı olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya

	L. 'dan elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları		b) 2,5 cm kalınlık ve genişlikten fazla olmayan parçalar halinde olduğu, veya c) Tüm profili boyunca sürekli, minimum 56 °C'lik bir sıcaklıkta kesintisiz minimum 30 dakika süreyle uygun bir ısıtma işlemine tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
187.	<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt, <i>Notholithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arnott) Manos et al, <i>Quercus</i> L. ve <i>Taxus brevifolia</i> Nutt. 'nın aşağıdakiler dışında ancak doğal yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; seviyadaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılsın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,	<i>Phytophthora ramorum</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	Oduunların; a) Menşee ülkedeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından ilgili ISPM'e göre, <i>Phytophthora ramorum</i> 'dan ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alannın adı, veya b) Kabuğu soyulmuş olduğu, ve i) Oduunların yuvarlak yüzeyi tamamen ortadan kaldırılacak şekilde kare şekli verilmiş olması, veya ii) Kuru madde oranında su içeriği, %20 altında olması, iii) Oduunun uygun bir sıcak hava veya sıcak su işlemiyle dezenfekte edilmiş olması, veya c) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Oduunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.
188.	<i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach ve <i>Quercus</i> L.'un aşağıdakiler dışında ancak doğal	<i>Neocerambyx raddei</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Oduunların;

	yuvarlak yüzeyini korumayanlar dahil odunları: Tamamı veya bir kısmı bu bitkilerden elde edilen talaş ve odun artıkları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılmasın ambalaj kutuları, ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, variller, makaralar ve benzeri ambalajlar, paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri,		<p>a) İlgili ISPM'e göre, menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu tarafından <i>Neocerambyx raddei</i>'den ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, veya</p> <p>b) Odunun tüm profili boyunca sürekli minimum 30 dakika boyunca minimum 56 °C sıcaklıkta uygun bir ısıtma işlemi tabii tutulduğu, veya</p> <p>c) Odunun profili boyunca minimum 1 kGy dozda elde etmek için uygun bir iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldığı, veya</p> <p>ç) Kabuksuz olduğu ve en büyük boyutta enine kesiti 20 cm'yi aşmadığı ve ilgili ISPM'e uygun bir sülfürlü florür fumigasyon işleminden tabii tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
189.	<i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach ve <i>Quercus</i> L. tamamen veya kısmen bu bitkilerden elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaş, tahta artıkları ve hurdaları	Çin, Kuzey Kore, Rusya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam	<p>Odunların;</p> <p>a) İlgili ISPM'e, göre, menşe ülkesindeki Ulusal Bitki Koruma Organizasyonu <i>Neocerambyx raddei</i>'den ari olarak oluşturulan bir alandan elde edildiği ve alanın adı, b) 2,5 cm kalınlık ve genişlikten fazla olmayan parçalar halinde olduğu, c) Odunun tüm profili boyunca sürekli minimum 30 dakika boyunca minimum 56 °C sıcaklıkta uygun bir ısıtma işlemi tabii tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
190.	<i>Quercus</i> L.'nin doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dahil, aşağıda belirtilenler dışındaki odunu:	<i>Bretziella fagacearum</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	<p>Odunların;</p> <p>a) <i>Bretziella fagacearum</i>'dan ari olduğu bilinen alanlardan elde edildiği, ve</p>

	<p>-Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, -Odunun minimum 176 °C’de 20 dakika süreyle ısıtım işlem uygulanarak üretildiğinin belgeli ispatının olduğu fiçılar, variller, tekneler ve diğer fiçıcılık ürünleri ile bunların fiçi tahtası dahil odun kısımları, -Kaplama üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza eden odun. -Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, her türlü ürünün nakliyesinde kullanılsın veya kullanılmasın ambalaj sandıkları, kutular, kafes sandıklar, makaralar ve benzeri ambalajlar. Paletler, kutu paletler, diğer yük araçları, palet halkalar ile istif tahtası formundaki ahşap ambalaj malzemeleri</p>		<p>b) Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu, veya c) Kabuksuz olduğu ve kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin %20’den az olduğu, veya ç) Kabuksuz olduğu ve onaylı bir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu, veya d) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın; kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, ‘fırında kurutulmuş’ veya ‘K.D.’ ibaresi bulunmalıdır.</p>
191.	<p>Tamamı veya bir kısmı <i>Quercus L</i>’den elde edilen, yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları</p>	<p><i>Bretziella fagacearum</i>’un varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların; a) <i>Bretziella fagacearum</i>’dan arı olduğu bilinen alanlardan elde edildiği, ve b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20’nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, veya c) Onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresine (saat) ait bilgiler, veya</p>

			ç) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz dahil tüm odun yüzeyinde sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısı işlem uygulandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
192.	<i>Quercus</i> L.'nin kaplama üretimi amaçlı, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza eden odunu.	<i>Bretziella fagacearum</i> 'un varlığı bilinen ülkeler	Odunların; a) <i>Bretziella fagacearum</i> 'dan ari olduğu bilinen alanlardan elde edildiği, ve b) Onaylı bir fümigasyon yapılmalı ve kullanılan aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m3) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat), Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. ve c) T.C. Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğ ile yetkilendirilen giriş gümrük idarelerinden giriş yapılmalıdır.
193.	Aşağıda belirtilenler dışındaki doğal yuvarlak yüzeyini korumayan odun ve mobilya ve işlem görmemiş odundan yapılan diğer ürünler dahil <i>Betula</i> L.'nin odunu; -Bu ağaçların tamamı veya bir kısmından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	<i>Agrilus anxius</i> varlığı bilinen ülkeler	Odunun; a) Resmî olarak denetlenen ve yetkili bir tesiste en az 2.5 cm kalınlığında kabuk ve kabuk alt tabakasının soyulmuş olduğu, veya b) Minimum 1 kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
194.	Aşağıda belirtilenler dışındaki doğal yuvarlak yüzeyini korumayan odun ve mobilya ve işlem görmemiş odundan yapılan diğer ürünler dahil <i>Betula</i> L.'nin odunu;	<i>Agrilus anxius</i> varlığı bilinmeyen ülkeler	Odunların; a) Menşee ülkesinin <i>Agrilus anxius</i> 'den ari olduğu, veya

	<p>-Bu ağaçların tamamı veya bir kısmından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>		<p>b) Onaylı bir fümigasyon yapılmalı ve kullanılan aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat), Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
195.	<p>Tamamen veya kısmen <i>Betula L.</i>'den elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları.</p>	<p>Tüm ülkeler</p>	<p>Odunların; a) Menşei ülkesinin <i>Agrilus anxius</i>'den ari olduğu, veya b) Onaylı bir fümigasyon yapılmalı ve kullanılan aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat), Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
196.	<p><i>Betula L.</i> ağacından elde edilen ağaç kabuğu ve kabuktan imal edilen ürünler</p>	<p>ABD, Kanada ve <i>Agrilus anxius</i>'un varlığı bilinen alanlar</p>	<p>Kabuğun odundan ari olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
197.	<p><i>Platanus L.</i>'un yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları hariç, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil odunu Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p><i>Ceratocystis platani</i> varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların; a) İlgili ISPM'e göre, <i>Ceratocystis platani</i>'den ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.</p>
198.	<p><i>Populus L.</i>'un doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler dâhil aşağıdakiler dışında odunu;</p>	<p>Amerika Kıtası</p>	<p>Odunların; a) Kabuksuz olduğu, veya</p>

	<p>-Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>		<p>b) Kuru madde oranı (yüzdesi) olarak ifade edilen, nem içeriğini %20'nin altına çekmek için, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile fırında kurutma işleminin yapıldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.</p>
199.	<p><i>Phytophthora ramorum</i>'un konukçularının odunları,</p>	<p>Tüm ülkeler</p>	<p>Odunların; a) <i>Phytophthora ramorum</i>'dan ari alanlar menşeli olmalı ve bu alanın adının Bitki Sağlık Sertifikasının "menşe yeri" başlığı altında yer aldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. veya b) Bitki Sağlık Sertifikası, odunların kabuklarının soyuldukları resmî olarak doğrulandıktan sonra düzenlenmelidir. ve -Yuvarlak yüzeyi tamamen kaybolacak kadar dört köşe şekil verilmiş olduğu, veya -Kuru madde yüzdesi ile ifade edilen nem içeriğinin %20'den az olduğu, veya -Onaylı bir sıcak hava veya sıcak su ile dezenfekte edilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. veya c) Eğer biçilmişse, üzerinde kabuk kalıntısı olsun ya da olmasın; 1) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20'nin altına çekmek için fırında kurutma</p>

			<p>işlemine maruz kaldığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir. Odunun veya ambalajının üzerinde, 'fırında kurutulmuş' veya 'K.D.' ibaresi bulunmalıdır.</p> <p>veya</p> <p>2) Onaylı bir fümigasyon yapılmalı ve kullanılan aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m³) ve uygulama (maruz kalma) süresi (saat), Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>
200.	<p><i>Anoplophora glabripennis</i>'in konukçularının aşağıda belirtilenler dışındaki, doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza etmeyenler ve ham ahşaptan imal edilen mobilya ve diğer ürünler dahil, odunu,</p> <p>-Yukarıda belirtilen ağaçların tamamından veya bazılarında elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p> <p>-Yukarıda belirtilen ağaçların tamamından veya bazılarında elde edilen yongalar,</p> <p>Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; seviyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri</p>	<p><i>Anoplophora glabripennis</i>'in varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre, <i>Anoplophora glabripennis</i>'den ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı,</p> <p>veya</p> <p>b) Kabuksuz yuvarlak odundan üretildiği ve öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C'lik bir ısıtma işlemi yapıldığı.</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p> <p>Isıtma işlemi tabii tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır.</p>
201.	<p><i>Anoplophora glabripennis</i>'in konukçularının tamamından veya bazılarında elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta artıkları ve hurdaları</p>	<p><i>Anoplophora glabripennis</i>'in varlığı bilinen ülkeler</p>	<p>Odunların;</p> <p>a) İlgili ISPM'e göre, <i>Anoplophora glabripennis</i>'den ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı,</p> <p>veya</p> <p>b) Kabuksuz yuvarlak odundan üretildiği ve öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C'lik bir ısıtma işlemi yapıldığı,</p> <p>Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.</p>

			Isıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalıdır. veya c) 2,5 cm'den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
202.	<i>Acer saccharum</i> Mars., <i>Platanus</i> L. ve <i>Populus</i> L. Türlerinin tamamı veya bir kısmından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurda şeklindeki odun	-ABD, Kanada, Ermenistan -Amerika Kıtası	Odonların; a) Kabuksuz yuvarlak odundan üretildiği, veya b) Kuru madde yüzdesi olarak ifade edilen, uygun bir zaman/sıcaklık göstergesi ile elde edilen, nem içeriğinin %20'nin altına çekmek için fırında kurutma işlemine maruz kaldığı, veya c) Onaylı bir fümigasyon işlemine tabi tutulduğu ve aktif bileşen, minimum odun sıcaklığı, dozu (g/m ³) ve uygulama (maruz kalma) süresine (saat) ait bilgiler, veya ç) En az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir öz dahil tüm odun yüzeyinde sıcaklığın sağlandığı uygun bir ısı işlem uygulandığı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
203.	<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> ., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> ., <i>Pyrus</i> ve <i>Sorbus</i> L'un Aşağıda belirtilenler dışındaki doğal yuvarlak yüzeyini muhafaza edenler dahil odunu; -Bu ağaçların tamamı veya bir kısmından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan;	<i>Saperda candida</i> 'nın varlığı bilinen ülkeler	Odonların; a) İlgili ISPM'e göre, <i>Saperda candida</i> 'dan arı olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısı işlemin sağlandığı ve ısı işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalı, veya

	sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri		c) Minimum 1kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
204.	<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> , <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> ., <i>Pyrus</i> L. ve <i>Sorbus</i> L.'un odunlarından elde edilen yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları.	<i>Saperda candida</i> 'nın varlığı bilinen ülkelerin ari üretim alanlarından	a) İlgili ISPM'e göre, <i>Saperda candida</i> 'dan ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) 2,5 cm'den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, veya c) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıl işlemin sağlandığı ve ısıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalı, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.
205.	Doğal yuvarlak yüzeyini korumamış olanlar dahil Aşağıdakiler dışında <i>Prunus</i> L.'nin odunları; Yonga, parçacık, talaş, rende talaşı, tahta atıkları ve hurdaları, Sevk edilen odunlar için Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen şartlar ile aynı şartları sağlayan; sevkiyattaki odunla aynı konukçu özelliği gösteren ve aynı kalitedeki odundan üretilmiş istif tahtaları hariç, tüm ahşap ambalaj malzemeleri	<i>Aromia bungii</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Odunların; a) İlgili ISPM'e göre, <i>Aromia bungii</i> 'den ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısıl işlemin sağlandığı ve ısıl işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi odunun veya ambalajın üzerinde bulunmalı, veya c) Minimum 1 kGy emilmiş doza ulaşılması için, odunun tamamen iyonlaştırıcı radyasyona tabi tutulduğu, Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmelidir.

206.	Tamamı <i>Prunus L.</i> 'den elde edilen hurda, talaş, talaş, odun atıkları ve hurdaları	<i>Aromia bungii</i> 'nin varlığı bilinen ülkeler	Odunların: a) İlgili ISPM'e göre, <i>Aromia bungii</i> 'den ari olarak belirlenen alan menşeli olduğu ve üretim alanının adı, veya b) 2,5 cm'den daha fazla kalınlık ve genişlikte olmayacak şekilde işlemden geçirilmiş olduğu, veya c) Öz dahil tüm odun yüzeyinde en az 30 dakika süreyle minimum 56 °C lik bir ısı işlemi sağlandığı ve ısı işleme tabi tutulduğunu gösteren HT ibaresi, ç) Ahşabın bütün profili boyunca en az 30 dakika boyunca en az 56 °C sıcaklık elde etmek için uygun bir ısı işlemi uygulanmış olduğu, Bitki Sağlık Sertifikasının üzerinde belirtilmelidir.
207.	6 mm veya daha az kalınlıkta ham odun ile tutkal, sıcaklık ve basınçla elde edilen işlenmiş odun hariç ambalajlama paketleri, kutuları, sandıkları, makaraları ve benzeri paketler şeklindeki ahşap ambalaj materyalleri ile tüm maddelerin nakli için kullanılan paletler, kutu paletler ve diğer yükleme tahtası, palet halkası	Tüm ülkeler	Ahşap ambalaj materyalleri; - ISPM 15 standardının Ek-1'inde belirtilen işlemlerden birisine tabi tutulmalı, ve -ISPM 15 standardının Ek-2'sinde belirtildiği şekilde işaretlenmiş olmalıdır.

EK-5

BİTKİ SAĞLIĞI KONTROLÜNE TABİ VE BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI TAŞIMASI
GEREKLİ BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER

GTİP	MADDE İSMİ
06.01	Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)
06.02	Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri, yosunlar (taze olanlar)
06.03	Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurukları (taze olanlar)
06.04	Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurucsuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)
07.01 ^(d)	Patates (taze veya soğutulmuş)
0702.00.00.00.00 ^(d)	Domates (taze veya soğutulmuş)
07.03	Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)
0703.10 ^(d)	Soğanlar ve şalotlar
07.04	Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)
07.05	Marul (<i>Lactuca sativa</i>) ve hindiba (<i>Cichorium spp.</i>) (taze veya soğutulmuş)
07.06	Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (<i>salsifis</i>), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
0706.10.00.00.11 ^(d)	Havuçlar
0707.00 ^(d)	Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
07.08	Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)
0708.10 ^(d)	Bezelye (<i>Pisum sativum</i>) (kabuklu veya kabuksuz)
0708.20 ^(d)	Fasulya (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) (Kabuklu veya Kabuksuz)
07.09	Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)
0709.30.00.00.00 ^(d)	Patlıcanlar
0709.60 ^(d)	<i>Capsicum</i> veya <i>Pimenta</i> cinsi meyveler
0709.92 ^(d)	Zeytin
0709.93 ^(d)	Balkabağı, kabak, su kabağı (<i>Cucurbita spp.</i>)
0712.90.11.00.00	Tohumluk (melez)
07.13	Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)
07.14	Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze veya soğutulmuş)
0801.12.00.00.00	İç kabuklu (endokarp) Hindistan cevizi
0801.19.00.00.00	Diğerleri
0801.21.00.00.00	Kabuklu Brezilya cevizi
0801.31.00.00.00	Kabuklu kaju cevizi

GTİP	MADDE İSMİ
0802.11	Kabuklu bademler
0802.21.00.00.00 ^(d)	Kabuklu fındık veya filbert (Corylus spp.)
0802.22.00.00.00 ^(d)	Kabuksuz fındık veya filbert (Corylus spp.)
0802.31.00.00.00	Kabuklu ceviz
0802.41.00.00.00	Kabuklu Kestane (Castanea Spp.)
0802.51.00.00.00 ^(d)	Kabuklu Antep fıstığı
0802.52.00.00.00 ^(d)	Kabuksuz Antep fıstığı
0802.61.00.00.00	Kabuklu Avustralya fındığı (Makadamy cevizi)
0802.70.00.00.00	Kola cevizi (Cola spp.)
0802.80.00.00.00	Arek cevizi
0802.91.00.00.00	Çam fıstığı (kabuklu)
0802.92.00.00.00	Çam fıstığı (kabuksuz)
0802.99	Diğerleri
08.03	Muz (plantain dahil) (yalnız taze olanlar)
0804.10.00.00.00	Hurma
0804.20.10.00.00 ^(d)	Taze incir
0804.20.90.00.19 ^(d)	Diğerleri (kurutulmuş incir) (kurutulmuş incirin ezmesi hariç)
0804.30.00.00.00	Ananas
0804.40.00.00.00	Avokado armudu
0804.50	Guava armudu, mango ve mangost
08.05	Turunçgiller (taze olanlar) (0805.90.00.00.12 GTİP'li kurutulmuş turunçgiller hariç)
0806.10	Üzümler (taze olanlar)
0806.20.10.00.00	Korint üzümü (kurutulmuş)
0806.20.20.00.00 ^(d)	Sultani üzümü (kurutulmuş)
0806.20.90.00.00 ^(d)	Diğerleri (Kurutulmuş)
08.07	Kavunlar (karpuzlar dahil) ve Papaya (taze olanlar)
08.08	Elma, armut ve ayva (taze olanlar)
0808.10.80.00.11 ^(d)	Golden cinsi
0808.10.80.00.13 ^(d)	Starking elma
0808.10.80.00.14 ^(d)	Starkrimson elma
08.09	Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze olanlar)
08.10	Diğer meyveler (taze olanlar)
0813.10.00.00.00 ^(d)	Kayısı (zerdali dahil) (kurutulmuş)
0813.50.39.00.00	Diğerleri
0814.00.00.00.00	Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze olanlar)
0910.11.00.00.00	Kafeini alınmamış
0901.11.00.00.00	Zencefil; ezilmemiş ve öğütülmemiş (taze olanlar)

GTİP	MADDE İSMİ
10.01	Buğday ve mahlut
10.02	Çavdar
10.03	Arpa
10.04	Yulaf
10.05	Mısır
1006.10	Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)
10.07	Koca darı (Grain Sorghum)
10.08	Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat
12.01	Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın)
12.02	Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)
1203.00.00.00.00	Kopra
1204.00	Keten tohumu (Kırılmış olanlar hariç)
1205.10.10.00.00	Tohumluk olanlar
1205.10.90.00.00	Diğerleri
1205.90.00.00.00	Diğerleri
1206.00	Ayçiçeği tohumu (Kırılmış olsun olmasın)
12.07	Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (Kırılmış olsun olmasın)(susam hariç)
1207.91.90.00.00 ^(d)	Diğerleri
12.09	Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporar:
1210.10.00.00.00	Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)
12.11	Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (Taze olanlar)
1212.21.00.10.00	Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.21.00.90.00	Diğerleri (taze olanlar)
1212.29.00.10.00	Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar
1212.29.00.90.00	Diğerleri (taze olanlar)
1212.91 ^(d)	Şekerpancarı
1212.92.00.00.00	Keçiboynuzu (harnup)
1212.93.00.00.00	Şeker kamışı (taze olanlar)
1212.94.00.00.00	Hindiba kökleri
1212.99.41.00.00	Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş keçiboynuzu tohumları
1212.99.49.00.00	Diğer keçiboynuzu tohumları
1212.99.95.00.13	Tatlı sorgum (saccharatum)
1212.99.95.00.14	Kayıtsı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri
1212.99.95.00.19	Diğerleri

GTİP	MADDE İSMİ
1213.00.00.00.00	Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1214.90	Diğerleri
1404.20.00.00.00	Pamuk linteri
1404.90.00.10.00	Yontulmaya elverişli sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (koroza cevizi, dom palmyesi cevizi ve benzerleri)
1404.90.00.30.00	Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın) ([sadece süpürge darısı (Sorghum spp.)])
1404.90.00.92.14	Palamut
1404.90.00.92.16	Ceviz kökü
1404.90.00.99.19	Diğerleri
24.01	Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
2403.91.00.00.00	“Homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün
2403.99.90.00.00	Diğerleri
2703.00	Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
44.01	Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)
44.03	Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kısırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın) (4403.11 Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş iğne yapraklı ağaçlar ve 4403.12 - Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş olanlar hariç)
44.04	Ahşap çemberler; yarılmış sırkalar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar (Kalınlığı 6 mm’yi geçenler)
44.06	Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri
44.07	Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zamparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın)
44.15	Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıncılar (4415.10.10.00.11 Kontraplak veya kaplama tahtasından yapılanlar ile sıkıştırılmış ahşap parçaçıklarından imal edilmiş ve ısıtılmış işlem görmemiş ahşap paletler hariç)
4416.00	Ahşap variller, fiçiler, kovalar, gerdeller ve diğer fiçici eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fiçi tahtaları dahil) (boyanmış ve verniklenmiş hariç)
4501.10.00.00.00	Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)
5201.00.90.00.11	Sürdürülebilir olanlar (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
5201.00.90.00.19	Diğerleri (Pamuk-karde edilmemiş veya penyelenmemiş)
5202.10.00.00.19	Diğerleri (Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.91.00.00.12	Tarak telefı (Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)

GTİP	MADDE İSMİ
5202.91.00.00.19	Diğerleri (Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.99.00.00.12	Tarak telefi (Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
5202.99.00.00.18	Diğerleri (Dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen geri dönüşümden elde edilenler hariç)
84.32	Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla bahçe tarımında ve ormancılıkta kullanılan makine ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler (ikinci el, kullanılmış olanlar)
84.33	Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve ot biçme makina ve cihazları; yumruları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç) (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8436.80.10.00.00	Ormancılığa mahsus olanlar (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.21.90.00.00	Kullanılmış olanlar (tarım ve ormancılıkta kullanılan araçlar)
8701.91.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.92.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.93.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.94.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
8701.95.10.00.00	Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler (kullanılmış veya yenileştirilmiş olanlar)
9603.10.00.00.00	Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)

(d) Zararlı Risk Analizine (ZRA) Tabidir. Olumlu sonuçlandırılmış bir ZRA Raporu olmadan ürünlerin ithaline izin verilmez.

EK-6
SERBEST BÖLGEYE DOLAŞIM FORMU

.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Yeniden ihraç etmeyi taahhüt ettiğim ve aşağıda bilgileri yazılı ürünün resmi kontrollerinin yapılarak depolanmak ve işlenmek üzere belirtilen serbest bölgeye hizmet veren gümrük müdürlüğüne geçiş izninin verilmesini arz ederim.

Adı Soyadı
Tarih:

SERBEST BÖLGEYE DOLAŞIM FORMU	
Başvuru Sahibinin Adı ve Adresi ¹	
Gönderici Firma Adı ve Adresi ²	
Alıcı Firma Adı ve Adresi ³	
Geldiği Ülke	
Menşe Ülke	
Taşıma Aracı[Araç Tipi/Araç Bilgisi]	
Giriş Gümrük İdaresi	
Gönderildiği Serbest Bölge Gümrük İdaresi	
BSS ⁴ Tarih ve Numarası	
Uluslararası Taşıma Belgesi Tarih ve Numarası	
Fatura Tarih ve No'su	
TPS müracaat numarası	
Beyanname Numarası	
13.Onaylı kontrol yerinin adı ve adresi:	14.Söz konusu ürünün gümrüklü sahaya planlanan giriş tarihi:
15.İthalatçının adresi:	16.Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Re-export Bitki Sağlık Sertifikası No:
17.Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi No:	18.Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi Veriliş Tarihi ve Yeri:
İthalatçı veya temsilcisinin imzası:	Tarih:

Ürünün Cins/Çeşidi	GTİP NO	Ambalaj Şekli ve Sayısı	Miktarı (Net)

TC
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
.....MÜDÜRLÜĞÜNE

Sayı:

Tarih

Konu: Serbest Bölgeye Dolaşım İzni

..... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE/İDARESİNE

Yukarıda bilgileri yazılı ürünlerin resmi kontrolü 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre yapılmış olup yeniden ihraçat işlemi öncesi depolanmak ve işlenmek üzere belirtilen Serbest Bölgeye geçişi için dolaşım formu düzenlenmesi uygun görülmüştür/görülmemiştir.

Gereğini arz ederim.

İnspektör (İmza)

¹ Zararlı Risk Analizine tabi ürünlerin yeniden ihraçat için serbest bölgeye geçiş için dolaşım formu başvurusu yapan üründen sorumlu kişi

² Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen "Gönderici" adı ve adresi

³ Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilen "Alıcı" adı ve adresi

⁴ Bitki Sağlık Sertifikasının tarih ve numarası

EK-7
BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

1.İhracatçının adı ve adresi 1.Name and address of exporter	2.BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI 2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE No: EC/TR	QR KOD
3.Alicının beyan edilen adı ve adresi 3.Declared name and address of consignee	4.Türkiye Bitki Koruma TeşkilatıBitki Koruma Teşkilatına 4.Plant Protection Organization of Türkiye to Plant Protection Organization (s) of	
6.Beyan edilen taşıma araçları 6.Declared means of conveyance	5.Menşe (Yer) 5.Place of origin	
7.Beyan edilen giriş yeri 7.Declared point of entry		
8.Ayır edici işaretler, Ambalaj adedi ve şekli 8.Distinguishing marks: Number and description of packages: Ürünün adı: Name of the product Bitkilerin botanik adı: Botanical name of plants	9.Beyan edilen miktar 9.Quantity declared	
10. Bu sertifika yukarıda tanımlanan bitki, bitkisel ürünleri veya düzenlemeye tabi diğer maddelerin; uygun resmî prosedürler uyarınca incelenmiş ve/veya test edilmiş, ve ithal eden ülke tarafından belirlenen karantina zararlılarından arı olduğunu, ve ithal eden ülkenin, karantinaya tabi olmayan ancak düzenlenmeye tabi zararlıları da içeren, geçerli bitki sağlığı gerekliklerine uygun, ve gerçekte diğer zararlılardan da arı olarak kabul edildiğini onaylamaktadır. 10. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above: have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing country, and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country, including those for regulated non-quarantine pests, and are deemed to be practically free from other pests.		
11.Ek beyan 11.Additional declaration		
DEZENFESTASYON ve/veya DEZENFEKSİYON UYGULAMASI DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	18.Sertifikanın verildiği yer 18.Place of issue of the certificate Tarih Date	
12.Muamele şekli 12.Treatment	Yetkili memurun Adı, Soyadı imzası	Kurumun Mühürü
13.Kimyasal (aktif madde) 13.Chemical (active ingredient)	14.Süre ve sıcaklık 14.Duration and temperature	Name and signature of the Authorized officer
15.Doğ 15.Concentration	16.Tarih 16.Date	Stamp of the Organization
17.İlave Bilgi 17.Additional information		

1. Name und Adresse des Ausführers:

Nom et adresse de l'exportateur:

2. PFLANZENGEUNDHEITSZEUGNIS

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE

3. Angegebener Name und Adresse des Empfängers:

Nom et adresse déclarés du destinataire

4. TÜRKİYE PFLANZENSCHUTZORGANISATION:

..... An die Pflanzenschutzorganisation

ORGANISATION TÜRKİYE DE PROTECTION DES PLANTES:

..... À l'Organisation de protection des végétaux

5. Ursprungsort:

Lieu d'origine:

6. Deklariertes Transportmittel:

Moyens de transports déclarés

7. Deklarierter Eintrittspunkt:

Point d'entrée déclaré

8. Unterscheidungsmerkmale: Anzahl und Beschreibung der Packstücke, Name des Erzeugnisses, Botanischer Name der Pflanzen.

Signes distinctifs : Nombre et description des colis, Nom du produit, Nom botanique des plantes:

9. Angegebene Menge:

Quantité déclarée:

10. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen geregelten Stoffe:

- nach geeigneten amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet wurden und
- frei von Quarantäneschädlingen sind, wie vom einführenden Land bestimmt, und
- den geltenden phytosanitären Anforderungen des Einfuhrlandes entspricht, einschließlich der Schädlinge, die nicht unter Quarantäne stehen, aber der Regulierung unterliegen; und
- bestätigt, dass es tatsächlich als frei von anderen Schädlingen anerkannt ist.

Le présent certificat atteste que les végétaux, produits végétaux ou autres substances réglementées décrits ci-dessus:

- ont été examinés et/ou testés conformément aux procédures officielles appropriées, et
- sont exempts d'organismes de quarantaine tels que déterminés par le pays importateur, et,
- est conforme aux exigences phytosanitaires applicables du pays importateur, y compris les organismes nuisibles non soumis à quarantaine mais faisant l'objet d'une réglementation ; et
- confirme qu'il est effectivement reconnu comme exempt d'autres organismes nuisibles.

11. Zusätzliche Erklärung:

Déclaration supplémentaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESINFEST ATOIN ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemisch (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matière active):

14. Dauer und Temperatur:

Durée et température:

15. Konzentration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Zusätzliche Informationen:

Renseignements complémentaires:

18. Ort der Ausstellung des Zertifikats:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten.

Dienstsiegel:

Lieu de délivrance du certificat:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

Cachet de l'organisation:

EK-8

YENİDEN İHRACAT (RE-EXPORT) BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI

1.İhracatçının adı ve adresi 1.Name and address of exporter		2.YENİDEN İHRACAT İÇİN BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI 2.PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT EC/TR		QR KOD
3.Alıcının beyan edilen adı ve adresi 3.Declared name and address of consignee		4.Türkiye Bitki Koruma TeşkilatıBitki Koruma Teşkilatına 4.Plant Protection Organization of Türkiye to Plant Protection Organization (s) of		
6.Beyan edilen taşıma araçları 6.Declared means of conveyance		5.Menşe (Yer) 5.Place of origin		
7.Beyan edilen giriş yeri 7.Declared point of entry				
8.Ayırt edici işaretler, ambalaj adedi ve şekli 8.Distinguishing marks: Number and description of packages: Ürünün adı: Name of the product Bitkilerin botanik adı: Botanical name of plants		9.Beyan edilen miktar 9.Quantity declared		
10. Bu belge,.....,sayılı <input type="checkbox"/> orijinali <input type="checkbox"/> *onaylı asıl kopyası bu belgeye eklenmiş, Bitki Sağlığı Sertifikası kapsamındaki <input type="checkbox"/> * ambalajlı <input type="checkbox"/> * yeniden ambalajlanmış <input type="checkbox"/> * orijinal konteynırda <input type="checkbox"/> * yeni konteynırda, <input type="checkbox"/> * orijinal Bitki Sağlığı Sertifikasına <input type="checkbox"/> * ilave denetime istinaden,'den/dan (menşe ülkesi) Türkiye Cumhuriyeti (re-export ülkesi)'ne ithal edilen yukarıda tanımlanan bitki, bitki ürünleri veya düzenlemeye tabi diğer maddelerin ithal eden ülkenin geçerli bitki sağlığı gerekliliklerine uygun olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nde (re-export ülkesi) depolama sürecinde sevkiyatın bulaşmaya veya zararlı istilası riskine maruz kalmadığını onaylamaktadır. (*) Uygun kutucukları işaretleyiniz.				
10. This is to certify that - the plants, plant products or other regulated articles described above were imported into the Republic of Türkiye (country of re-export) from.....(country of origin) covered by Phytosanitary Certificate No., original <input type="checkbox"/> *certified true copy <input type="checkbox"/> * of which is attached to this certificate; that they are packed <input type="checkbox"/> * repacked <input type="checkbox"/> * in original <input type="checkbox"/> * new <input type="checkbox"/> * containers, based on the original Phytosanitary Certificate <input type="checkbox"/> * and additional inspection <input type="checkbox"/> *, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country, and - during storage in the Republic of Türkiye (country of re-export), the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. (*) Insert tick in appropriate boxes				
11.Ek beyan 11.Additional declaration		18.Sertifikanın verildiği yer 18.Place of issue of the certificate		
DEZENFESTASYON VE/VEYA DEZENFEKSİYON UYGULAMASI DESINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT		Tarih Date		
12.Mücadele şekli 12.Treatment		Yetkili memurun Adı, Soyadı İmzası Name and signature of the authorized officer		Kurum Mühürü Stamp of the Organization
13. Kimyasal (Aktif Madde) 13.Chemical (Active Ingredient)	14.Süre ve sıcaklık 14.Duration and temperature			
15. Doz 15. Concentration	16.Tarih 16.Date			
17.İlave Bilgi 17.Additional Information				

1. Name und Adresse des Ausführers:

Nom et adresse de l'exportateur:

2. PFLANZENGEUNDHEITSZEUGNIS FÜR DIE WIEDERAUSFUHR

CERTIFICATE PHYTOSANITAIRE POUR LA REEXPORTATION

3. Angegebener Name und Adresse des Empfängers:

Nom et adresse déclarés du destinataire

4. TÜRKİYE PFLANZENSCHUTZORGANISATION:

..... An die Pflanzenschutzorganisation

ORGANISATION TÜRKİYE DE PROTECTION DES PLANTES:

..... À l'Organisation de protection des végétaux

5. Ursprungsort:

Lieu d'origine:

6. Deklariertes Transportmittel:

Moyens de transports déclarés

7. Deklarierter Eintrittspunkt:

Point d'entrée déclaré

8. Unterscheidungsmerkmale: Anzahl und Beschreibung der Packstücke, Name des Erzeugnisses, Botanischer Name der Pflanzen.

Signes distinctifs : Nombre et description des colis, Nom du produit, Nom botanique des plantes:

9. Angegebene Menge:

Quantité déclarée:

10. Hiermit wird bestätigt, dass den oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen oder sonstigen einer Regelung unterliegenden Gegenständen, die aus.....(Ursprungsland) in die Republik Türkei (Wiederausfuhrland) eingeführt worden sind, das Pflanzengesundheitszeugnis Nr...eigefügt war, dessen Original oder beglaubigte Kopie als Anlage diesem Zeugnis beiliegt; und

- sie verpackt umgepackt worden sind, in ihren ursprünglichen in neuen Behältern befördert werden,
- sie im Hinblick auf das ursprüngliche Pflanzengesundheitszeugnis und einer zusätzlichen Untersuchung mit den im Einfuhrland geltenden pflanzengesundheitlichen Vorschriften entsprechend übereinstimmen, und die Sendung während ihrer Lagerung in der Republik Türkei (Wiederausfuhrland) keiner Gefahr eines Befalls oder einer Infizierung ausgesetzt war.

(*) Zutreffendes ankreuzen

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en la République de Türkiye (pays de réexportation) en provenance de.....(pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat Phytosanitaire No.....

dont l'original la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat;

- qu'ils sont emballés remballés dans les emballages initiaux dans de nouveaux emballages
- que d'après le Certificat Phytosanitaire original et une inspection supplémentaire ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur et qu'au cours de l'emmagasinage en la République de Türkiye (pays de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.

(*) Mettre une croix dans la case appropriée

11. Zusätzliche Erklärung:

Déclaration supplémentaire:

ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

TRAITEMENT DE DESINFESTATION ET/OU DESINFECTION

12. Behandlung:

Traitement:

13. Chemisch (aktiver Wirkstoff):

Produit chimique (matière active):

14. Dauer und Temperatur:

Durée et température:

15. Konzentration:

Concentration:

16. Datum:

Date:

17. Sonstige Angaben:

Renseignements complémentaires:

18. Ort der Ausstellung des Zertifikats:

Datum:

Name und Unterschrift des amtlichen Beauftragten.

Dienstsiegel:

Lieu de délivrance du certificat:

Date:

Nom et signature du fonctionnaire autorisé:

Cachet de l'organisation:

EK-9

BİLDİRİM FORMU

NOTIFICATION OF INTERCEPTION OF A CONSIGNMENT OR HARMFUL ORGANISM
(ZARARLI ORGANİZMA VEYA SEVKİYATI ENGELLEME BİLDİRİMİ)

<p>1. CONSIGNOR (Gönderici) a. Name (İsim): b. Address (Adres): c. Country (Ülke):</p>	<p>2. INTERCEPTION FILE (Engelleme Dosyası) a. Reference number (Referans no): TR.../.../..... Requests for message to be sent to (dağıtım yapılacak kuruluşlar) b. Member States (Üye ülkeler) c. European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)</p>
<p>3. CONSIGNEE (Alıcı) a. Name (İsim): b. Address (Adres): c. Country (Ülke): d. Country + e. Place of destination: (Ülke ve varış yeri):</p>	<p>4. a. Plant Protection Organization of (Bitki Koruma Teşkilatı): b. to (gideceği Bitki Koruma Teşkilatı) 5. a. Country (Ülke) + b. Place of export (İhraç eden yer): 6. a. Country (Ülke) + b. Place of origin (Malın menşesi):</p>
<p>7. TRANSPORT a. Mode of transport (Taşıma şekli): b. Mean(s) of transport (Taşıma araçları): c. Identification(s) (Özellikleri):</p>	<p>9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGNMENT (Sevkiyatın tanımı) a. Type of document (Belgenin tipi): b. Document number (Belge no): c. Country (Ülke) + Place of issue (Hazırlandığı yer): d. Date of issue (Hazırlanma tarihi):</p>
<p>8. Point of entry (Giriş yeri): 10. DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGNMENT (Sevkiyatın engellenen kısmının tanımı) a. Type of package(s)/container(s): (Ambalajın/taşıyıcının çeşidi) b. Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s): (Ambalaj/taşıyıcının ayırt edici işaretleri) c. Number(s) of package(s)/container(s): (Ambalaj/taşıyıcının sayısı) d. Plant, plant product or other object: (Bitki, bitkisel ürün veya diğer maddeler) e. Class of commodity: (Ticari malın çeşidi)</p>	<p>11. a. Net mass/volume/number of units in the consignment: (Sevkiyat içindeki malın net ağırlık/hacim/birim sayısı) b. Unit of measure : (Ölçü birimi) 12. a. Net mass/volume/number of units of the intercepted part: (Engellenen kısmın net ağırlık/hacim/birim sayısı) b. Unit of measure: (Ölçü birimi) 13. a. Net mass/volume/number of units of the contaminated part: (Bulaşık kısmın net ağırlık/hacim/birim sayısı) b. Unit of measure: (Ölçü birimi)</p>
<p>14. REASON(S) FOR INTERCEPTION (Engelleme nedeni) a. Reason(s) (Neden(ler)): b. Scientific name of the harmful organism : (Zararlı organizmanın bilimsel adı) c. Extent of the contamination : (Bulaşmanın derecesi)</p>	<p>16. FREE TEXT (İlave bilgi)</p>
<p>15. MEASURES TAKEN (Alınan önlemler) a. Measures (Önlemler) : b. Extent of the measures (Önlemin kapsamı) : QUARANTINE IMPOSED (Uygulanan Karantina) c. Begin date: d. Anticipated end date: (Başlangıç tarihi) (Tahmini bitiş tarihi) f. Country (Ülke) +g. Place of quarantine (Karantina yeri) :</p>	<p>17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION (Engelleme hakkında bilgi) a. Place/check point (Kontrol noktası/yeri) : b. Official service (Resmî servis) : c. Date (Tarih) :</p>
<p>17. INFORMATION ON THE INTERCEPTION (Engelleme hakkında bilgi) a. Place/check point (Kontrol noktası/yeri) : b. Official service (Resmî servis) : c. Date (Tarih) :</p>	<p>18. SENDER OF THE MESSAGE (Mesajı gönderen) a. Official service + b. Official stamp : (Resmî servis + resmî mühür) c. Person responsible for the file : (Dosyadan sorumlu kişi) d. Date (Tarih): e. İmza:</p>

EK-10
SEVKİYAT BİLDİRİMİ FORMU

Bitki Karantinası Yönetmeliği, Madde 8-(2)a'ya göre Sevkiyat Bildirimi

1.Bitki veya bitkisel ürünün tanımı:	2.Miktarı:
3.Gönderen ülke:	4.Menşe ülke:
5.Gönderici:	6.Alıcı:
7.İthalatçı sicil numarası:	8.Giriş noktası:
9. Hava Yolu Taşıma Senedi (AWB) numarası:	10. Gemi adı ve konteyner numarası:
11. Araç plakası:	12.Beklenen geliş tarihi ve zamanı:
Aşağıdaki maddeler giriş noktası dışında başka bir varış noktasına sevki durumunda doldurulur.	
13.Onaylı kontrol yerinin adı ve adresi:	14.Söz konusu ürünün gümrüklü sahaya planlanan giriş tarihi:
15.İthalatçının adresi:	16.Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Re-export Bitki Sağlık Sertifikası No:
17.Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi No:	18.Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi Veriliş Tarihi ve Yeri:
İthalatçı veya temsilcisinin imzası :	Tarih :

BİTKİ SAĞLIĞI DOLAŞIM BELGESİ

1. Bitki Karantinası Yönetmeliği Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi		2. BİTKİ SAĞLIĞI DOLAŞIM BELGESİ No: TR/.../....¹	
3. <u>Sevkiyatın Tanımlanması</u> ² İthal Edilmek İstenen Ürün <input type="checkbox"/> Geri Dönen Ürün <input type="checkbox"/> Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddenin GTIP kodu:..... Bitki Sağlığı Sertifikalarının numarası (numaraları):..... Düzenlendiği Yer:..... Düzenlendiği Tarih:..... Ayırt edici işaret (ler), sayılar, ambalaj sayıları, miktar (ağırlık/birim):..... Gerekli Gümrük Belgelerinin referans numarası (numaraları).....			
4. İthalatçının sicil numarası/Geri dönen ürün başvuru numarası..... Yukarıda bahsedilen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin beyan ve bitki sağlık kontrollerinin, giriş noktasındaki Müdürlük tarafından uygun görülmesi durumunda aşağıda listelenen onaylı kontrol yerinde, varış noktasındaki Müdürlük tarafından yapılmasını arz eder, belirlenen prosedürler ve kurallara uymayı taahhüt ederim. Tarih, ithalatçının – Geri dönen ürün/temsilcisinin/taşıyıcısının adı ve imzası :			
5.1. Giriş Noktası		5.2. Giriş noktasındaki sorumlu İnspektörün imzası (tarih, isim, kaşe ve imza)	
6. Yetkili giriş noktası/Onaylı kontrol yeri ³ A-		B (A'nın yerine)	
Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ve..... arasında yapılan anlaşma uyarınca ⁴ yukarıda bahsedilen yere (yerlere) dolaşıma çıkarılmıştır.			
7. Belge Kontrolü ⁵		8. Beyan Kontrolü ⁶	
9. Bitki Sağlığı Kontrolü ⁶			
Yer/Tarih :..... İsim:..... Kaşe/İmza:		Yer/Tarih :..... İsim:..... Kaşe/İmza:	
10. Karar ⁶ Girişine izin verme Yer/tarih..... İsim :..... Kaşe/İmza : Uygun olduğu durumda TR Bitki Pasaportu (seri ya da parti ya da hafta) Numarasını belirtiniz:..... Resmî Önlem <input type="checkbox"/> Girişin reddi <input type="checkbox"/> Dolaşımı <input type="checkbox"/> Enfekte ya da bulaşık ürünün ayrılması <input type="checkbox"/>			
İmha <input type="checkbox"/> Karantina süresi <input type="checkbox"/> Uygun muamele <input type="checkbox"/> Açıklama:			

¹İl Trafik Kodunu ve Sıra Numarasını girin.²İlgili bölümü doldurun ya da eşlik etmesi gereken Bitki Sağlığı Sertifikasındaki (BSS) numaraya atıfta bulunun/Geri dönen ürünlerin dolaşım işlemine ihracat için düzenlenmiş olan BSS numarası yazılmalıdır.³Bitki Karantinası Yönetmeliği'nin Madde 4 (1)inci fıkrası (II) bendi hükümlerinde belirlenen yerler.⁴Uygun olduğu durumda Gümrük İdaresi ile Müdürlük arasındaki anlaşmayla ilgili ya uzun dönemli anlaşmaya istinaden ya da durum bazında bir anlaşmaya dair detayları veriniz.⁵7 no'lu bölüm Giriş Noktasındaki Müdürlük tarafından düzenlenir.⁶8,9,10 no'lu bölüm Varış Noktasındaki Müdürlük tarafından düzenlenir.